Precauciones y Advertencias:
Grupo químico: el ingrediente activo mandipropamida pertenece al grupo químico mandelamidas y el ingrediente activo oxatiapiprolina pertenece al grupo químico de las piperidinil tiazol isoxazolinas.
- durante su manejo: vestir ropa de protección (**durante la preparación de la mezcla** usar guantes impermeables, protector facial, botas de goma y delantal impermeable) y **durante la aplicación** usar guantes impermeables, protector facial, botas de goma y overol impermeable). Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No respirar el producto concentrado ni la neblina de pulverización. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse inmediatamente cualquier salpicadura. Si ocurre algún problema, detener el trabajo, aplicar las medidas de primeros auxilios y llamar inmediatamente a un médico. No contaminar aguas, alimentos o forraje. Alejar a los animales. No recolectar alimentos o forraje del área recién tratada.
- después su manejo: lavarse las manos y cara con abundante agua antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Lavarse muy bien todo el cuerpo antes de dejar el lugar de trabajo. Lavar aparte la ropa y el equipo usados.

Instrucciones para el Triple Lavado: una vez vacío el envase, agregar agua hasta ¼ de su capacidad, agitar por 30 segundos y vaciar el contenido en la máquina pulverizadora. Repetir esta operación TRES VECES. Luego, destruir los envases vacíos (cortándolos y perforándolos) y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes, lejos de áreas de pastoreo, viviendas y agua. No dañar la etiqueta durante todo este proceso.

Almacenar bajo llave, en los envases originales cerrados y con la etiqueta correspondiente, a la sombra, en un lugar seco y bien ventilado, aparte de alimentos y forraje.

Síntomas de intoxicación: no existe sintomatología específica. Sin embargo, pueden esperarse mareos, náuseas y dolor de cabeza como signos o síntomas genéricos inespecíficos y más comunes de la intoxicación aguda por plaguicidas. Ante cualquier síntoma de malestar general siga las instrucciones especificadas en primeros auxilios.

Primeros auxilios: en todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.
En caso de inhalación, llevar al afectado a un área bien ventilada. En caso de respiración irregular, o detenida, administrar respiración artificial. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico.
En caso de contacto con la piel, retirar ropa y zapatos, lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico. Lavar la ropa antes de volver a usar. **En caso de contacto con los ojos**, lavarlos inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continuar con el enjuague hasta completar los 15 o 20 minutos. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente Acudir al médico inmediatamente. **En caso de ingestión**, **NO INDUCIR EL VÓMITO**. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente a un centro asistencial.

Antídoto: no se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Tratamiento médico de emergencia: ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica. Si existe la posibilidad de una toxicidad severa, considerar el lavado gástrico, protegiendo la vía aérea. El máximo beneficio de la descontaminación gastrointestinal se espera dentro de la primera hora de ingestión. No inducir el vómito.

Información ecotoxicológica: prácticamente no tóxico para peces y aves. **VIRTUALMENTE NO TÓXICO PARA ABEJAS**.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS"
"EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"
"REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL"
"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"
"LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE"
"NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO"

Convenio CITUC/AFIPA - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana:
En caso de INTOXICACIÓN llamar al ☎: 2 2635 3800
En caso de EMERGENCIAS QUÍMICAS, DERRAME o INCENDIO, llamar al ☎: 2 2247 3600

11.09.25

ORONDIS® ULTRA

FUNGICIDA
Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Mandipropamida*	23,08 % p/p (250 g/L)
Oxatiapiprolina**	2,77 % p/p (30 g/L)
Coformulantes, c.s.p.	100 % p/p (1083 g/L)

* (*RS*)-2-(4-clorofenil)-*N*-[3-metoxi-4-(prop-2-iniloxi)fenetil]-2-(prop-2-iniloxi)acetamida.
** 1-(4-{4-[(5*RS*)-5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}-1-piperidil)-2-[5-metil-3- (trifluorometil)-1*H*-pirazol-1-il]etanona

NO INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO

ORONDIS® ULTRA es un fungicida de acción preventiva, sistémico, de rápida penetración en los tejidos vegetales, que combina la acción de sus ingredientes activos para el control de Mildiú en cebolla. Su absorción por el tejido foliar permite un buen movimiento translaminar y la protección de los tejidos nuevos. **ORONDIS® ULTRA** inhibe la formación y expansión de la lesión, el desarrollo y la producción de esporangios, la liberación de zoosporas y la germinación de citosporas.

Contenido Neto del Envase:

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 20031

Fabricado por:
Syngenta Crop Protection LLC., Omaha Plant, 4111 Gibson Road, Omaha, Nebraska 68107, Estados Unidos.
Syngenta Limited, Earls Road, Grangemouth, Stirlingshire, FK3 8XG, Reino Unido.
Syngenta Protecao de Cultivos Ltda., Rodovia Professor Zeferino Vaz, SP332, s/nº, km 127,5 Bairro Santa Terezinha, Paulinia - SP, CEP 13148-915, Brasil.
Syngenta S.A., Carretera a Mamonal, km 6, Cartagena, Colombia.

Importado y Distribuido por:
Syngenta S.A., Isidora Goyenechea 2800, Of. 3701, Las Condes, Santiago - Chile. Teléfono: 2 2941 0100

Lote de fabricación:
Fecha de vencimiento:
®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

INSTRUCCIONES DE USO
Para manejo de resistencia considere:

Grupo FRAC Mandipropamida	**40**	**Fungicida**
Grupo FRAC Oxatiapiprolina	**49**	**Fungicida**

ORONDIS® ULTRA es un fungicida de acción preventiva, sistémico, de rápida penetración en los tejidos vegetales. Aplicar de acuerdo a los siguientes programas de tratamiento:

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Enfermedades	Dosis	Observaciones
Cebolla	Mildiú (*Peronospora destructor*)	0,4 - 0,6 L/ha	Aplicar preventivamente al follaje de la planta, con una frecuencia de 7 a 10 días de acuerdo con las condiciones de desarrollo de la enfermedad. Utilizar la dosis máxima y el menor intervalo cuando se espere una alta presión de la enfermedad. Es fundamental que la aplicación asegure un buen cubrimiento de los tejidos vegetales a proteger. Aplicar hasta 3 veces por temporada. Se recomienda aplicar con mojamiento de 400 a 600 L/ha, dependiendo del estadio del cultivo.
Tomate (aire libre)	Tizón Tardío (*Phytophthora infestans*)	0,4 L/ha	Aplicar preventivamente al follaje de la planta, con frecuencia de 7 a 14 días de acuerdo con las condiciones de desarrollo de la enfermedad. Utilizar el intervalo menor cuando las condiciones predisponen una alta presión del patógeno. Es fundamental que la aplicación asegure un buen cubrimiento de los tejidos vegetales a proteger. Aplicar hasta 3 veces por temporada, alternando con fungicidas de modo de acción distinto. Se recomienda aplicar con un volumen de mojamiento de 500 L/ha, dependiendo del estado del cultivo.

Nota: para obtener mejor cobertura del cultivo, se recomienda adicionar un adyuvante. Dirigir siempre las aplicaciones al follaje, mojando bien toda la planta. No aplicar en las horas de más calor o cuando el follaje está húmedo o la lluvia es inminente. No aplicar con vientos superiores a 10 km/hora.

Método de preparar la mezcla: agitar el envase previo a preparación y constantemente durante la aplicación del producto para mantener siempre una suspensión uniforme. Agregar la cantidad necesaria de **ORONDIS® ULTRA** al estanque del equipo aplicador a medio llenar de agua limpia, poner en marcha el agitador mientras se completa el volumen total de agua del estanque y durante la aplicación. Agite bien la mezcla y aplíquela en pocas horas.

Manejo y grupo de resistencia: Mandipropamida pertenece al grupo FRAC 40 y Oxatiapiprolina pertenece al grupo FRAC 49.
El uso repetido de productos para el control de patógenos específicos puede conducir a la selección de cepas resistentes de hongos y resultar en una reducción del control de enfermedades.
En un mismo cultivo, las aplicaciones de **ORONDIS® ULTRA** deben realizarse de manera preventiva y no más de tres (3) veces en secuencia antes de aplicar un fungicida con un modo de acción diferente. La exposición a **ORONDIS® ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga FRAC 49) no debe exceder el treinta y tres por ciento (33%) del período total de protección necesario por cultivo. Cuando un fungicida con un modo de acción diferente sigue a la (s) aplicación (es) de **ORONDIS® ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga FRAC 49), este fungicida preferiblemente debe tener actividad curativa.
- **ORONDIS® ULTRA** (o cualquier otro producto que contenga FRAC 49) no debe usarse en la producción de viveros de cultivos trasplantados.
- No se debe realizar ninguna aplicación de fungicida foliar en base de oxatiapiprolina (o cualquier otro producto que contenga FRAC 49) después de una aplicación con fungicidas del mismo grupo para el tratamiento de semillas o suelo.
- En caso de cultivos sucesivos, no hacer más de seis (6) aplicaciones de oxatiapiprolina (o cualquier otro producto que contenga FRAC 49) por año en la misma área contra el mismo patógeno.

Incompatibilidad: no se conocen incompatibilidades. Como es imposible conocer la compatibilidad de **ORONDIS® ULTRA** con todos los productos del mercado, Syngenta S.A. no asume responsabilidades por mezclas hechas con otros productos que no sean mencionados específicamente en esta etiqueta. En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación.

Fitotoxicidad: Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan problemas de fitotoxicidad.

Período de carencia (días entre la última aplicación y la cosecha): cebolla, tomate: 7 días. Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

Tiempo de reingreso: no ingresar al área tratada antes de 4 horas desde la aplicación, que es cuando se estima completamente seco el depósito aplicado, a menos que vista ropa de protección. No corresponde indicar período de reingreso para animales, pues el objetivo productivo de los cultivos no es alimentación animal (pastoreo).

Importante: La información contenida en esta etiqueta representa el más reciente conocimiento de Syngenta en las materias informadas. No obstante, Syngenta garantiza exclusivamente la calidad del Producto y de su contenido activo, mientras esté bajo su control directo. Las instrucciones de conservación y uso describen, conforme a las pruebas realizadas, la forma apropiada de operar el Producto para obtener los resultados esperados. Sin embargo, dichas instrucciones no constituyen garantía explícita ni implícita, debido a la existencia de circunstancias externas en un medio biológico cambiante, que se encuentran fuera del control de Syngenta. Todos nuestros productos han sido debidamente probados; a pesar de ello, no es posible testear todos los usos, formas o métodos de aplicación, medios agroclimáticos, suelos, fechas de aplicación y sistemas de cultivo a los que el Usuario pueda eventualmente someter al Producto, por los que Syngenta no se hace responsable. Ante cualquier duda, consulte con su asesor técnico de Syngenta. Asimismo, una vez que el Producto sale del control directo de Syngenta, cumpliendo las características anteriormente señaladas, el Usuario asume todos los riesgos asociados al uso, momento y manejo del Producto, aun siguiendo las instrucciones contenidas en esta etiqueta, como asimismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en las jurisdicciones relevantes. La información de la presente etiqueta sobre naturaleza y uso del Producto anula cualquier otra, ya sea escrita u oral.



CUIDADO

