

Fertilizante inorgánico con alto
contenido de fósforo y potasio

FOSFIMAX 40-20

RIQUEZAS GARANTIZADAS	% p/p	% p/v
Fósforo (P_2O_5) *	40,0	59,6
Potasio (K_2O)	20,0	29,8
PARAMETROS FISICO QUÍMICOS		
Solubilidad en agua a 20° C: 100%		
pH: 2,25		
Densidad a 20° C: 1490 g/L		
ELEMENTOS ACOMPAÑANTES: Arsénico (As) < 100 mg/Kg; Cadmio (Cd) < 0,5 mg/Kg; Cromo Hexavalente (CrVI) < 2 mg/Kg; Mercurio (Hg) < 0,5 mg/Kg; Níquel (Ni) < 20 mg/Kg; Plomo (Pb) < 10 mg/Kg		
Formulación: Solución líquida		

CONTENIDO: 20 l

 **BOAMERICA**

FERTILIZANTE INORGÁNICO CON ALTO CONTENIDO DE FÓSFORO Y POTASIO

CARACTERÍSTICAS:

FOSFIMAX 40-20 es una solución de fósforo y potasio. Se transloca tanto en sentido ascendente como descendente. La elevada riqueza en fósforo hace de FOSFIMAX 40-20 un producto idóneo para su empleo durante todo el ciclo de cultivo y particularmente para los momentos de fructificación por su elevada concentración en potasio.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS l/ha	CONCENTRACIÓN cc/100 l	OBSERVACIONES	
Cítricos	3,0-5,0	200-300	Iniciar las aplicaciones si las condiciones son favorables, cada 20 a 30 días.	
Carozos, Cerezos, Pomáceas			Aplicar al menos dos veces por cada flush de crecimiento radicular o durante el ciclo completo del cultivo.	
Paltos	120-150			
Nogal				
Frambuesa, Arándano, Frutilla	2,0-4,0	200-300		Aplicar con brotes de 20-30 cm y repetir a los 12 a 15 días.
Uva, Kiwis	3,0-5,0		Aplicar 45, 30 y 15 días de cosecha y/o después de cada lluvia.	
Manzano	3,0-5,0			
Papa	3,0-4,0	400-500	Desde plantas con 30 cm de altura.	
Cebolla, Ajo	1,0-3,0		Aplicar en almaciguera desde 2 hojas verdaderas, al trasplante y repetir cada 7 a 10 días.	
Tomate, Pimiento Melón, Sandía, Zapallo, Repollo, Colíflor, Brócoli, Lechuga				
Maiz				1,0-1,5

Se aplica durante todo el ciclo de cultivo.

COMPATIBILIDADES:

FOSFIMAX 40-20 es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas, excepto con hidróxidos de zinc, dícofol, dimetoato, aceites y productos cúpricos. No obstante, puede ser aplicado una semana antes o tres después del empleo de aceites o fungicidas cúpricos.

ADVERTENCIAS:

Toda la información recogida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

IMPORTADOR:



BIOAMERICA, S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago – Chile
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

FABRICADO POR:



FUTURECO BIOSCIENCE S.A.
Av. del Cadí, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola. Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com



PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase alejado de alimentos bebidas y piensos.
Lavarse las manos después de la aplicación.
Mantener el envase en lugar fresco y aireado.

FECHA DE CADUCIDAD:

5 años desde la fecha de fabricación.

LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN:

Ver información en el envase.

CONTENIDO NETO: 20 l