

QUITO-OLIGOSACARIDOS



ESTIMULA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO DE LA PLANTA



OLIGOSACÁRIDOS
NATURALES DERIVADOS
DE QUITOSANO, CON
AVANZADA TECNOLOGÍA



PREVIENE DAÑOS POR
ESTRÉS BIÓTICO EN LAS
PLANTAS, EFECTO SAR



NUEVA SOLUCIÓN PARA
HONGOS DE LA MADERA



LIBRE DE CARENCIAS Y
ECOFRIENDLY

COMPOSICIÓN

INGREDIENTES	% (p/p)
Potasio (K ₂ O)	2%
Oligosacáridos	-2%

Densidad a 20°C: 1,1 g/ml

pH al 0,2% a 20°C: 5

Solubilidad a 20°C: 100%

Formulación concentrado soluble - SL **Modo de acción** absorción foliar y radicular

CARACTERÍSTICAS

RESISGARD es un bioestimulante líquido de nueva generación y de amplio espectro, en base a oligosacáridos de quitosano. Cuenta con una formulación específica, creada con el objetivo de estimular el crecimiento equilibrado de las plantas.

RESISGARD es rico en ingredientes activos de bajo peso molecular derivados de organismos marinos. Su composición permite aumentar el contenido de azúcares en las células vegetales, lo que favorece la prevención de diversos daños por estrés biótico.

Con RESISGARD se asegura el aporte de 20 g de Oligosacáridos derivados de quitosano.

RESISGARD tiene una alta calidad de formulación, no deja depósitos sobre los órganos aplicados.



Evaluación efecto de Resisgard en el control de *Cytospora leucostoma* en ramillas de Cerezo

Cuadro 1. Inhibición de la lesión (%) causada por *Cytospora leucostoma* en ramillas de cerezo cv. Lapins para los distintos tratamientos, luego de 38 días post inoculación

Tratamiento Tratamiento		Dosis cc/hL	Inhibición de la lesión (%)
T1	Resisgard	150	58,32 a
T2	Testigo absoluto		0,00 b

RAMILLAS DE CEREZO



UNIVERSIDAD
DE CHILE



T1



T2

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	CONCENTRACIÓN	DOSIS	OBSERVACIONES
Vid – Kiwi	100 – 150 cc/100 l	1 – 1,5	Desde brotación en adelante c/15 días
Cítricos – Paltos		1 -1,5	Desde marzo en adelante c/ 15 días
Duraznero – Nectarín – Damasco - Cerezo		1 – 1,5	Brotación y Pre-cosecha
Manzano - Peral		1 -1,5	Brotación y Post-cosecha c/15 días
Arándanos – Frambuesas – Frutillas		0,5 – 1	Desde brotación c/15 días y Post-cosecha
Nogales – Almendros - Avellanos		1,5 - 2	De fruto cuajado en adelante
Hortalizas		0,5	Desde transplante en adelante

Aplicaciones vía riego de 4l/ha en Frutales y 2l/ha en Hortalizas con raíces activas.