Basfoliar® Forte SL



Fertilizante Foliar

- Nombre Comercial: Basfoliar® Forte SL
- Nombre químico: Fertilizante foliar
- Nombre Común: Basfoliar® Forte SL
- Grado: AGRÍCOLA

Producido por: COMPO EXPERT Italia s.r.l
Comercializado por: COMPO EXPERT Chile Fertilizantes Ltda.

ANALISIS QUÍMICO

Nitrógeno Total	20,0% p/v (16% p/p)
N Nítrico	4,4% p/v (3,5% p/p)
N Amoniacal	6,5% p/v (5,2% p/p)
Ureico	9,1% p/v (7,3% p/p)
Oxido de magnésio (MgO)	5,0% p/v (4% p/p)
Trióxido de Azufre (SO3)	10,0% p/v (8% p/p)
Glicinabetaina	6,3% p/v (5% p/p)

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO

APARIENCIA	Líquido Verde
pH (sol. 1:10 a 20°C)	7 – 7,5
SOLUBILIDAD a 20°C	100%
DENSIDAD a 20°C	1.250 g/L
TOXICIDAD	NO TÓXICO, NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO y NO PELIGROSO
ENVASES	20 L

DESCRIPCIÓN

Basfoliar® Forte SL es un fertilizante foliar nitrogenado, con magnesio, azufre y glicinabetaina. Basfoliar® Forte SL está especialmente diseñado para la aplicación foliar.

BENEFICIOS

Basfoliar® Forte SL proporciona a los cultivos mayor resistencia al estrés hídrico y salino, así como al estrés por frio y calor.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis/aplicación	N° aplicaciones	Época de aplicación
Praderas	2 L/ha	3-4	Aplicar en praderas después del pastoreo, con un rezago de 7-10 días para que exista abundante área foliar (follaje) para que la aplicación sea asimilada. Cubrimiento 100 a 200 L agua/ha.
Maíz	2 L/ha	3 a 4	Aplicar en estado de 3-4 hojas, repitiendo al estado de 6 a 8 hojas ó 7 a 10 días después de la primera aplicación. Cubrimiento 200 a 300 L agua/ha , según el Estado de desarrollo del cultivo.
Papas	2 L/ha	3 a 4	Aplicar con planta de 30 cm de altura. Repetir cada 21 días 3-4 oportunidades durante de desarrollo del cultivo.
Cereales: Trigo, Cebada, Avena, Centeno.	2-3 L/ha	3 a 4	Aplicar con planta de 10 cm. Repetir si es necesario cada 21 días durante el cultivo. Dosis de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo.
Hortalizas de Hoja y Crucíferas (Raps)	2-3 L/ha	2-3	Aplicar 2 semanas después del trasplante. Repetir cada 21 días 2-3 veces.
Hortalizas de Fruto	2-3 L/ha	2-3	Durante la etapa de desarrollo vegetativo 2-3 aplicaciones cada 14 días. Dosis de acuerdo al desarrollo del cultivo.
Frutales, Cerezos, Kiwis, Avellanos, Nogales.	2-3 L/Ha	2 a 4	Aplicar durante las fases de desarrollo vegetativo, postcosecha y previo a un posible momento de estrés.
Uva de mesa y vinífera	2 - 3 L/ha	2 a 4	En brotación hasta antes de floración.
Cítricos	2 - 4 L/ha	-	Previo a estrés ambiental (altas temperaturas, estrés hídrico).
Olivos	2 a 3 L/ha	-	Previo a estrés ambiental (altas temperaturas, estrés hídrico).

PRECAUCIONES

Basfoliar® Forte SL es compatible con la mayoría de los fitosanitarios. En caso de dudas, se recomienda realizar pruebas previas.

Basfoliar® Forte SL es considerado no tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto, para el manejo seguro es necesario atenerse a las precauciones de uso de los productos fitosanitarios con que haya sido mezclado Basfoliar® Forte SL.

Basfoliar® es marca registrada de COMPO EXPERT.