

Fertilizante inorgánico
en base a boro complejo
por monoetanolaminas

DEFENDER
B

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

ELEMENTOS	% p/p	% p/v
Boro(B)*	11,0	15,0

***Boro complejo por monoetanolamina**

CONTENIDO EN METALES PESADOS:

Arsénico (As) < 5 mg/kg; Cadmio (Cd) < 0,5 mg/kg; Mercurio (Hg) < 0,5 mg/kg;
Plomo (Pb) < 0,5 mg/kg; Cromo hexavalente (CrVI): < 2 mg/kg; Níquel (Ni): < 100 mg/kg

Formulación: Solución líquida

PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS

Densidad a 20°C: 1360 g/L

pH: 8

Solubilidad en agua a 20°C: 100%

CONTENIDO: 20l

 BOAMERICA

FERTILIZANTE INORGÁNICO EN BASE A BORO COMPLEJADO POR MONOETALONAMINAS

CARACTERÍSTICAS:

El boro es un microelemento esencial en el metabolismo de la planta, interviene en la absorción y metabolismo del calcio acumulándose en la pared celular unido a las pectinas, confiriendo elasticidad y firmeza a los tejidos. El boro tiene un importante papel en la división celular y por lo tanto en el crecimiento. **DEFENDER BORO** trabaja en el metabolismo glucídico, participa en el proceso de elongación del tubo polínico, fecundación y cuaja de frutos, aumentando el potencial productivo del huerto.



RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS l/ha	CONCENTRACIÓN cc/100l	OBSERVACIONES
Olivos ,Paltos, Cítricos, Arándanos, Frutillas, Frambuesas	En floración, desarrollo de frutos y post-cosecha.	1,0-3,0	80-150	Permite homogenizar madurez en el racimo y aumentar la materia seca. Se recomienda aplicarlo junto a Defender Calcio . Aplicar con hojas activas. Para aplicaciones en mezcla con calcio, usar dosis de 30 a 50 cc/100l.
Pomáceas, Kiwis	Desde botón floral.			
	De inicio de crecimiento de frutos.			
	Post cosecha temprana.			
Carozos, Cerezos	Desde botón floral.			
	Desde caída de pétalos en adelante.			
	Post cosecha temprana.			
Uva	De racimo expuesto a inicio de floración.			
	De inicio de crecimiento de bayas a pintas.			
	De inicio de pinta a pre-cosecha.			
Trigo	Inicio de aparición de la espiga.	0,75-1,0	100-150	Aplicar junto a Defender Zinc . Repetir a los 20 días. Repetir a los 20 y 40 días. Realizar 2 aplicaciones cada 12 días. Repetir a los 15 y 30 días. Ideal combinar esta aplicación con Defender Calcio .
Maíz	Inicio de emisión de seda.			
Remolacha	A partir de 4-6 hojas verdaderas.			
Raps	Estado de roseta e inicio de flor.			
Apio	Iniciar aplicaciones con 30 cm de altura de planta.			
Tomates y pimientos	Inicio de floración.			
Melón, Sandía, Zapallo				

PRECAUCIONES:

Manténgase en lugar fresco y seco a temperaturas entre 0 - 50°C.
Manténgase alejado de los niños.
Manténgase lejos de alimentos bebidas y piensos.
No aplicar en horas de máxima radiación solar.
No sobrepasar las dosis recomendadas.

ADVERTENCIAS:

Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

AGITAR ANTES DE USAR.

COMPATIBILIDADES:

Es compatible con la mayoría de fertilizantes y fitosanitarios.
No se recomienda su aplicación conjunta con sulfato de manganeso, sulfato de zinc y productos de reacción alcalina.


FECHA DE CADUCIDAD:

5 Años desde la fecha de fabricación.

LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN:

Ver información en el envase.

CONTENIDO NETO: 20l



IMPORTADOR:



BIOAMERICA, S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago – Chile
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

FABRICADO POR:



FUTURECO BIOSCIENCE S.A.
Av. del Cadi, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola. Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com