

DEFENDER® ZINC

Grupo: Correctores Nutricionales

PRINCIPALES BENEFICIOS

- ✓ Previene y corrige carencias de zinc en el tejido vegetal
- ✓ Promueve el proceso fotosintético en la planta
- ✓ Incrementa la elongación y el desarrollo de brotes

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	%(p/p)	%(p/v)
*Zinc (Zn)	10	13,2

*Zinc complejoado con lignosulfonatos

Solubilidad a 20°C: 100%

pH: 6,07


Densidad a 20°C: 1320 g/L

Formulación Concentrado Soluble - SL
Modo de Acción Absorción foliar

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DEFENDER ZINC es un corrector nutricional líquido en base a zinc. Cuenta con una formulación específica, creado con el objetivo de prevenir y corregir carencias de zinc en las plantas. DEFENDER ZINC viene complejoado con lignosulfonatos, esto garantiza una efectiva y rápida absorción foliar. Es eficaz al momento de aportar zinc disponible, potenciando su aprovechamiento como cofactor enzimático de metabolismos esenciales en las plantas.

DEFENDER ZINC tiene una alta calidad de formulación, no deja depósitos o residuos sobre los órganos aplicados y el 100% del zinc viene disponible para que sea asimilado por la planta.




DEFENDER® ZINC

RECOMENDACIONES DE USO

ESPECIE	CONCENTRACIÓN cc/100 L	DOSIS L/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN
Uva vinífera, Uva de mesa y Kiwis	40 - 80	0,5 - 1	Desde inicios de brotación a postcosecha temprana, repetir cada 10 a 14 días
Manzanos y Perales			Puntas verdes, repetir a los 7 días
			En botón, repetir 7 y 14 días después
		1	Postcosecha con hojas activas, repetir a los 14 días
Cerezos, Ciruelos, Nectarines, Durazneros y Almendros		0,5 - 1	Puntas verdes, repetir a los 7
			En botón, repetir 7 y 14 días después
			En caída de chaqueta, repetir cada 14 días y en post-cosecha temprana
Nogales y Avellanos		1 - 2	Desde inicios de brotación, repetir a los 14 y 21 días
Paltos, Naranjos, Mandarinos, Limones y Olivos			En brotación de primavera y en brotación de otoño , repetir a los 14 días
Arándanos, Frambuesas y Frutillas		0,5 - 1	Desde inicios de brotación a postcosecha temprana
Raps		0,5 - 1	Durante estado de roseta y floración
Tomate, Pimiento y Pepino	40 - 80	1 - 2	Desde el trasplante en adelante
Melón, Sandía y Zapallo			
Cebolla y Ajo			
Apio, Lechuga y Espinaca			
Papa			Con suficiente desarrollo vegetativo
Maíz			Desde 5 hojas expuestas y desde emisión de seda
Trigo			Inicios de macolla y espigadura

Vía riego usar 1 a 2 L/ha



DEFENDER® ZINC

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

DEFENDER ZINC se aplica mediante aspersión foliar. Se debe utilizar suficiente agua para mojar todo el follaje de las plantas. Se puede aplicar mediante equipos pulverizadores, electrostáticos y aéreos (incluyendo drones).

DEFENDER ZINC es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados. No obstante se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación. Ante mayores dudas, consultar al Departamento Técnico de Bioamerica.

ADVERTENCIAS

La información entregada en esta ficha técnica es el resultado de rigurosos estudios que respaldan la composición, estabilidad y efectividad del producto. No obstante, al momento de la utilización en campo, hay una serie de variables adicionales que dependen principalmente del agricultor, de las características propias del huerto, de las condiciones climáticas de la localidad, entre otras. Dado esto, es deber del usuario observar y asumir toda la información de esta ficha técnica, y así evitar posibles daños por falta de eficacia, toxicidad general, manchas por depósitos, residuos, etc. Evitar aplicar con temperaturas extremas

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C

PRESENTACIÓN

Envases: 5 - 20 L

