

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico. El ingrediente activo Ciclaniliprol pertenece al grupo químico de las amidas antranilicas.

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Cuando se use el producto no comer, beber ni fumar. Al abrir el envase, evitar salpicaduras. Durante su **preparación y aplicación** se debe utilizar equipo de protección personal consistente en antiparras, máscara con filtro, botas de goma, guantes impermeables y overol impermeable.

Riesgo Ambiental: Altamente tóxico a organismos acuáticos (invertebrados acuáticos) y abejas. Prácticamente no tóxicos a aves y peces. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS**
- REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES**
- NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA**
- EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD**
- NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO**
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL**
- LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE**

Instrucciones de Triple Lavado:

- Paso 1:** Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total.
- Paso 2:** Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar.
- Paso 3:** Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente se debe perforar el envase una vez terminado el triple lavado para evitar su reutilización y proceder según legislación nacional.

Síntomas de Intoxicación: Dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, mareo y diarrea.

PRIMEROS AUXILIOS:

En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

En caso de Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar.

En caso de Inhalación: Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

Tratamiento Médico de Emergencia: Tratamiento sintomático y de soporte.

Antídoto: No específico

Teléfonos de Emergencia: CITUC (+562) 2 635 3800 (24 horas)

Almacenar en envase original, cerrado adecuadamente y con la respectiva etiqueta, en un lugar seguro, fresco y seco, separado de alimentos y forrajes. Mantener bajo llave y lejos del alcance de los niños.

MUTEKI

INSECTICIDA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Ciclaniliprol es un insecticida modulador de los receptores de Ryanodina para el control de los insectos incluidos en el cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN:

Ciclaniliprol*..... 5% p/v (50 g/L)
Cofomulantes c.s.p.....100% p/v (1 L)

* 2',3-dibromo-4'-cloro-1-(3-cloro-2-piridil)-6'-
{{(1RS)-1-ciclopropiletil]carbamoil}-1H-
pirazol-5-carboxanilida

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.909

<<LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

Lote N°:.....

Fecha de Fabricación (mes y año):

Fecha de Vencimiento:.....

Contenido Neto:

NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

Fabricado por:
IBC Manufacturing Company
416 East Brooks Road, Memphis,
Tennessee, 38109,
Estados Unidos

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
3-15 Edobori 1 Chome
Nishi-ku Osaka 550 0002, Japón

Importado y Distribuido por:
ISK Biosciences Corporation Chile y
Compañía Limitada
Estoril 50 Ofc. 715, Las Condes –
Santiago - Chile

INSTRUCCIONES DE USO

MUTEKI es un insecticida de amplio espectro. Su ingrediente activo Ciclaniliprol es un modulador de los receptores de Ryanodina, que actúa provocando parálisis en los insectos, deteniendo su alimentación y movimiento. Vea el Cuadro de Instrucciones de Uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso

Cultivo	Plagas	Dosis*	Observaciones
Manzano y Peral	Polilla de la manzana (<i>Cydia pomonella</i>)	60 – 80 cc/hl; 900-1200 cc/ha	Frecuencia de aplicación 14 a 21 días, volumen de agua de 1500L/ha Iniciar aplicaciones para la protección de fruto a los 100 días grado del vuelo sostenido de la plaga. Realizar máximo 2 aplicaciones por generación de la misma plaga en un mismo cultivo. Usar la dosis mayor e intervalo menor de tiempo en condiciones de alta infestación de la plaga, y dosis menor e intervalo mayor de tiempo cuando la infestación de la plaga sea baja.
Nogales		32 – 48 cc/hl ; 800-1200 cc/ha	Comenzar las aplicaciones con frutos de 3 cm de diámetro. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por temporada, con un intervalo entre aplicaciones de 21 días y considerando la rotación con insecticidas de otro modo de acción. Emplear un volumen de agua de acuerdo al crecimiento del árbol procurando una buena cobertura, volumen de 2500 L de agua/ha.
Durazneros Nectarinos Ciruelos Cerezos Guindos	Polilla oriental del duraznero (<i>Cydia molesta</i>)	40 – 60 cc/hl; 800-1200 cc/ha	Iniciar las aplicaciones al comienzo de la pinta de los frutos. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por temporada, con un intervalo entre aplicaciones de 21 días y considerando la rotación con insecticidas de otro modo de acción. Emplear un volumen de agua de acuerdo al crecimiento del árbol procurando una buena cobertura del follaje, volumen de agua sugerido 2000 l de agua/ha. Usar la dosis mayor e intervalo menor de tiempo en condiciones de alta presión de la plaga, y dosis menor e intervalo mayor de tiempo cuando las condiciones de la plaga sean menores.
Papa	Minador de las chacras (<i>Liriomyza sp.</i>)	800 -1200 cc/ha	Iniciar las aplicaciones al inicio de floración. Aplicar cada 7 días utilizando un volumen de agua que permita un buen cubrimiento del cultivo, se sugiere un volumen 800l de agua/ha. Aplicar hasta 2 veces en la temporada alternando con plaguicidas de diferente modo de acción. Usar la dosis mayor en condiciones de infestación media a alta de la plaga. Puede proteger hasta por 28 días.

*Dosis de producto formulado al 5%.

Instrucciones de aplicación: Se recomienda el uso de MUTEKI como parte de un programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP), que puede incluir el uso de variedades de cultivos resistentes a plagas, prácticas culturales, rotación de cultivos, agentes de control biológico, detección y sistemas de pronóstico de plagas destinados a prevenir daño económico.

Preparación: Agite bien la botella antes de utilizar el producto. Llene el estanque del equipo hasta la mitad con agua y agite continuamente mientras vierte lentamente la cantidad de **MUTEKI** a utilizar. Una vez obtenida una mezcla homogénea, agregue el agua restante manteniendo la agitación. No almacenar la mezcla de aspersión por más de un día.

Incompatibilidad: No se conocen incompatibilidades. No obstante, se recomienda no mezclar con productos de reacción alcalina o fuertemente oxidantes.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que aquí se indican.

Manejo de resistencia: Ciclaniliprol, ingrediente activo de MUTEKI, pertenece al grupo 28 de IRAC. Dentro del mismo cultivo no aplicar MUTEKI u otro insecticida del Grupo 28 más de 2 veces por generación de plaga de insecto.

Periodo de Carencia (días): Manzano (7), peral (7), durazneros (7), nectarinos (7), ciruelos (7), cerezos (7), guindos (7), nogales (30), papa (7)

Tiempo de Reingreso (personas y animales): No reingresar al área de aplicación antes de 4 horas de aplicado el producto.

TOXICO PARA ABEJAS

Precauciones de aplicación para protección de las abejas: NO APLICAR CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN PECOREANDO ACTIVAMENTE en cultivos, árboles frutales, malezas o vegetación circundante. Aplique al anochecer o temprano en la mañana, durante los momentos de baja actividad de las abejas cuando los cultivos están en flor, evitando la deriva. Retirar colmenas presentes dentro del área tratada o directamente adyacentes al área tratada antes de la aplicación y no regresarlas al área tratada antes de 24 horas después de la aplicación.

Nota: El fabricante garantiza la óptima calidad del producto y su efectividad, cuando se utiliza de acuerdo con su recomendación. Sin embargo, éste no se responsabiliza por fallas, daños y perjuicios que pudiera ocasionar su uso inadecuado ya sea por mal manejo del almacenamiento y/o mala manipulación de los envases y/o trasvasijos.



NOCIVO

