Palabra de advertencia: **PELIGRO**

Pictogramas:



Indicaciones de peligro:
H314: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. H302: Nocivo en caso de ingestión.

Consejos de prudencia:
P260: No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles. P264: Lavar exhaustivamente manos y rostros después del manejo del producto. P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P280: Usar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos, la cara, oídos. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico. P321: Tratamiento específico (véase en esta etiqueta). P363: Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P301+P312: EN CASO DE INGESTIÓN: llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico, si la persona se encuentra mal. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua (o ducharse). P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P405: Guardar bajo llave. P501: Disponer de los contenedores de acuerdo a la regulación nacional.

FOSFIGHT 40-20

Número de lote: ver envase.
Fecha de fabricación: ver envase.
Fecha de vencimiento: ver envase.

Fertilizante inorgánico compuesto por más de un macronutriente

Composición:	
Pentóxido de Fósforo (P^2O^5)	40% m/v
Óxido de Potasio (K^2O)	20% m/v

Contaminantes	
Arsénico: 3,0 ppm	Mercurio: 1,0 ppm
Cadmio: 1,0 ppm	Plomo: 5,0 ppm
Cromo (VI): 2,0 ppm	Níquel: 10,0 ppm

Parámetros fisicoquímicos
Fertilizante líquido en solución.
Solubilidad: 100% a 20°C.
Densidad: 1,15 g/ml a 20°C.
pH (al 10%): 1,8 a 20°C.

CONTENIDO: 17 LITROS

Formulador:

Empresas Cloramon S.A.
Panamericana Norte
#8900 con las
Esteras Sur.
Quilicura
Santiago, Chile.

Envasador:

anasac

ANASAC CHILE S.A.
Camino Noviciado Norte
Lote 73-B.
Lampa – Santiago, Chile.

CARACTERÍSTICAS

FOSFIGHT 40-20 es un fertilizante líquido rico en fósforo y potasio, en el que todo el fósforo procede del ion fosfito (749 gramos/l de ion fosfito). El producto tiene la capacidad de ingresar a la planta tanto por el follaje como por las raíces, translocándose de forma ascendente y descendente. Fosfight 40-20 puede ser aplicado al follaje o vía riego por goteo, durante todo el ciclo de desarrollo de los cultivos. Aplicaciones múltiples de FOSFIGHT 40-20 son más efectivas que una sola aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO. Fertilizante líquido de aplicación vía foliar o vía riego.

CULTIVO	DOSIS l/ha	OBSERVACIONES
Uva de mesa, vinífera y pisquera	3 - 5	Aplicar con brotes de 20-30 cm y repetir 15-20 días previo a floración. Inmediatamente postcosecha repitiendo a los 15-20 días.
Carozos, Cerezas, Pomáceas	3 - 5	Inmediatamente en postcosecha repitiendo a los 15-20 días.
Kiwis	3 - 5	Aplicar con brotes de 20-30 cm y repetir 15-20 días previo a floración. Inmediatamente postcosecha repitiendo a los 15-20 días.
Cítricos	3 - 5	Aplicar durante todo el período de crecimiento vegetativo y precosecha. Inmediatamente postcosecha repitiendo a los 15-20 días.
Olivos	3 - 5	Aplicar durante el período de crecimiento ramillete e inicio del endurecimiento del carozo. Repetir a los 15 – 20 días.
Avellano Europeo	3 - 5	Aplicar durante el flush de crecimiento radical e inmediatamente postcosecha. Repetir a los 15-20 días.
Nogales	3 - 4	
Berries (Arándanos, Frambuesas, Frutillas, Zarzaparrilla, Mora)	2 - 4	
Paltos	6 - 8	Aplicar en cada flush de crecimiento radical repitiendo a los 15 días.
Tomate, Pimentón, Melón, Zapallo, Sandía, Repollo, Coliflor, Brócoli, Lechuga	1 - 3	Aplicar en almaciguera, desde 2 hojas verdaderas y post trasplante, durante todo el período de crecimiento vegetativo.
Papas	3 - 4	Desde inicio de tuberización.
Cebolla, Ajo	3 - 4	Aplicar en almaciguera, desde 2 hojas verdaderas y post trasplante, durante todo el período de crecimiento vegetativo.
Maíz	1 - 1,5	Desde 3 - 4 hojas.
Forestales (Pino y Eucalipto)	3 - 5	Aplicar durante el período de crecimiento vegetativo, repitiendo cada 20 días.
Ornamentales	3 - 5	

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 km/hora. Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura (inferiores a 30°C) y viento, temprano en la mañana o al atardecer. Almacenar en lugar fresco y seco, evitando luz solar directa sobre el producto. Utilizar vestimenta adecuada durante la preparación y aplicación del producto. Evite el contacto con ojos y piel. No comer, beber o fumar durante su manipulación o aplicación. Conserve en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar ventilado, fresco y seco, fuera del alcance de niños y animales. El producto es estable a temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C. Agitar antes de usar.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos en base a cobre, calcio, aceites, cinc, dicofol y dimetoato. Es compatible con la mayoría de los fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares. Sin embargo, como no se pueden predecir todas las mezclas, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad y tolerancia. Consultar con el equipo técnico de ANASAC CHILE S.A. mayores antecedentes de compatibilidad específica con fitosanitarios.