Helvetica Neue Condensed - Cuerpo 8 Helvetica Neue Condensed 24, 10, 8 27,5 cm. Helvetica Neue Condensed - Cuerpo 7

13,5 cm.

2,0 cm.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.
Lambda- cihalotrina, ingrediente activo de **Trinica®** CS, pertenece al grupo químico de los Piretroides. No fumar comer o beber durante el uso de este producto. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación de la mezcla usar guantes impermeables, botas de goma, máscara con filtro, delantal impermeable y antiparras. Durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, máscara con filtro, antiparras, y overol impermeable. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento. No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua. Después del trabajo cámbiese y lave la ropa de trabajo. Lavarse prolijamente con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño o después del trabajo. Conservar este producto en su envase original bien cerrado debidamente rotulado guardado bajo llave en un lugar ventilado fresco y seco. Almacene el material en un lugar fuera de la luz.
SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los síntomas de intoxicación pueden ser: Parestesia cutánea, entumecimiento, irritación de la piel, ojos rojos, tos y estornudos.
PRIMEROS AUXILIOS: En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **En caso de Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **En caso de contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. **En caso de Inhalación:** Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.
Tratamiento médico de emergencia: Aplicar tratamiento base.
Antídoto: No existe antídoto específico.
ECOTOXICIDAD: Trinica® CS es extremadamente tóxico para peces y organismos acuáticos, no contamine cursos de agua. Ligeramente tóxico para aves. **MUY TÓXICO PARA ABEJAS.**
DEBE DAR AVISO A LOS APICULTORES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE ÁREA DE APLICACIÓN Y ZONA DE INFLUENCIA AL MENOS 48 HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA DE APLICACIÓN.
APLICAR EN HORARIOS DE BAJA ACTIVIDAD DE LAS ABEJAS, COMO TEMPRANO EN LA MAÑANA O AL ATARDECER.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
Instrucciones de Triple Lavado: Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios secos sin tapa en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado.
En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA - CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es: 2 25604500, Santiago, Chile.

UPL

Trinica® CS

INSECTICIDA
SUSPENSIÓN DE ENCAPSULADO (CS)

Contenido Neto: 1 Litro
Autorización del servicio Agrícola y Ganadero N°: **1.930**

Trinica® CS es un piretroide sintético con actividad insecticida de contacto e ingestión, no sistémico, con efecto de repelencia y anti-alimentario. Posee buen efecto de volteo que actúa sobre los insectos indicados en el Cuadro de Instrucciones de Uso, de esta etiqueta.

COMPOSICIÓN:
Lambda-cihalotrina*.....25 % p/v (250 g/L)
Coformulantes c.s.p. .....100 % p/v (1 L)
*Mezcla racémica del par enantiomérico B de la cihalotrina: (1*S*,3*S*)-3-((*Z*)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (*R*)-α-ciano-3- fenoxibencilo (1*R*,3*R*)-3-((*Z*)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de (*S*) -α-ciano-3-fenoxibencilo

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Importado y distribuido por:
UPL Chile S.A.
El Rosal 4610, Huechuraba,
Santiago - Chile
ET1930-V007-OS1

Fabricado por:
UPL Limited
3-11, GIDC., Vapi,
Gujarat - 396 195
Plot No. 3101/02, G.I.D.C,
Ankleshwar Gujarat-393 002,
India.

Fecha Vencimiento:

Lote Nº:

INSTRUCCIONES DE USO
Trinica® CS es un piretroide sintético con actividad insecticida de contacto e ingestión, no sistémico, con efecto de repelencia y antialimentario. Posee buen efecto de volteo que actúa sobre los insectos indicados en el Cuadro de instrucciones de uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Cerezas, Ciruelas, Nectarines, Pluots y Plumcots	Mosca de alas manchadas (*Drosophila suzukii*)	2 - 4 cc/hL ó 30 - 80 cc/ha	Aplicar de acuerdo con monitoreo de la plaga, desde estado fenológico de pinta a cosecha. N° máximo de aplicaciones por temporada: 4 con una frecuencia de 7 días entre aplicaciones. Resguardar los períodos de carencia indicados en la etiqueta*.
Manzanos, Perales, Membrilleros	Polilla de la manzana (*Cydia pomonella*)	3 - 6 cc/100 L (Mínimo 40 cc/ha)	Aplicar de acuerdo con monitoreo de la plaga. Utilizar la dosis menor para períodos de protección más cortos donde hay un activo crecimiento de frutos y brotes; y la mayor para conseguir un período de protección más prolongado cuando está totalmente desarrollado el fruto. Aplicar hasta 3 veces por temporada utilizando intervalos entre 7 y 21 días. Resguardar los períodos de carencia indicados en la etiqueta. Para volúmenes mayores respetar la dosis por concentración (cc/hL).
Nogales	Polilla de la manzana (*Cydia pomonella*)	4 - 6 cc/100 L (Mínimo 80 cc/ha)	
Durazneros, Cerezos, Ciruelos, Damascos, Nectarines, Pluot y Plumcot	Polilla oriental (*Cydia molesta*)	2 - 4 cc/100 L (Mínimo 30 cc/ha)	
Tomates	Polilla del tomate (*Tuta absoluta*)	50 cc/ha	Aplicar de acuerdo con monitoreo de folíolos dañados y monitoreo de la plaga, de estados adultos, larvas. N° máximo de aplicaciones por temporada: 4 con una frecuencia de 7 días entre aplicaciones.
Praderas	Cuncunilla negra de las empastadas (*Dalaca pallens*)	30 – 40 cc/ha	Utilizar en praderas de baja altura o después de corte. Aplicar mientras exista presión de la plaga hasta 4 veces por temporada con intervalo de 10 a 30 días. Aplicar dosis mayor con alta presión de la plaga.

***NOTA:** La dosis a usar (mayor o menor) dependerá del grado o condiciones de presión imperantes al momento de su aplicación.
Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y agregar la cantidad recomendada de **Trinica®** CS, luego completar con agua hasta el nivel requerido, manteniendo siempre el sistema agitador funcionando.
APLICACIÓN: Aplicar **Trinica®** CS con pulverizadora de barra o con nebulizadora dependiendo del cultivo, asegurando un buen cubrimiento del follaje. No aplicar con viento superior a 8 km/h para evitar la deriva, a horas de calor (temperaturas mayores a 28° C), ni cuando se pronostican lluvias dentro de 6 horas. Para los cultivos indicados en el cuadro de instrucciones de uso, usar los siguientes mojamientos: Carozos: 1.500 a 2.000 L/ha; Pomáceas y Nogales: 2.000 L/ha; Tomates: 1000 L/ha; Praderas: 200 L/ha.
COMPATIBILIDADES: Trinica® CS presenta compatibilidad física con formulaciones de tipo Suspensión concentrada, Gránulo dispersable en agua, Polvos humectables y Líquido soluble comúnmente utilizadas. Sin embargo, antes de realizar una mezcla, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad y/o consultar a nuestro departamento técnico.
INCOMPATIBILIDADES: Incompatible con productos con fuerte reacción alcalina o fuertemente oxidantes. En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación.
FITOTOXICIDAD: Trinica® CS no presenta fitotoxicidad en las especies recomendadas, si se utiliza de acuerdo con la forma y dosis que se indican. En caso de dudas consultar a nuestro departamento técnico.
PERIODO DE CARENCIA: Cerezas: 5 días; Ciruelas, Nectarines, Duraznos, Damascos, Pluots y Plumcots: 7 días Manzanos, Perales, Membrilleros: 21 días; Tomates: 5 días; Nogales y Praderas: 0 días. Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.
TIEMPO DE REINGRESO: Reingresar al área tratada después de 48 horas de realizada la aplicación.
MANEJO DE RESISTENCIA: Lambda-cihalotrina es un insecticida del Grupo 3A. El uso repetido de insecticidas del grupo 3A sobre generaciones sucesivas puede resultar en la selección de individuos resistentes.
NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto aplicándolo según nuestras instrucciones se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

®Trinica es marca registrada



PANTONE Process Yellow C