PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.
GRUPO QUÍMICO: Acetamiprid y Clorantraniliprol, ingredientes activos de **LEXICON®**, pertenecen a los grupos químicos de los Neonicotinoides y de las Amidas Antranilicas, respectivamente.
Se debe evitar su inhalación, ingestión, el contacto con la piel, proyecciones en los ojos y la contaminación de los alimentos. No fume, coma o beba durante el uso de este producto. **Durante la preparación del producto:** Usar guantes impermeables, máscara con filtro, antiparras, overol impermeable y botas de goma. **Durante la aplicación del producto:** Usar antiparras, máscara con filtro, overol impermeable, guantes impermeables y botas de goma. Quítese el equipo de protección personal inmediatamente después de manipular este producto. Lave el exterior de los guantes antes de sacárselos. Tan pronto como sea posible, debe lavarse y ponerse ropa limpia. Deseche la ropa y otros materiales absorbentes que hayan sido altamente contaminados con el producto. No vuelva a reutilizarlos. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. No inhalar los vapores o aspersiones del producto. No aplicar contra el viento. No contaminar alimentos, semillas, forrajes y cursos de agua. No permitir la entrada de terceras personas en áreas que estén siendo sometidas a tratamiento o manipulación del producto, así como de animales domésticos.
SINTOMAS DE INTOXICACION: El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Evite el contacto con la piel, ojos o ropa.
PRIMEROS AUXILIOS: En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.
En caso de **contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente.
En **caso de Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO**. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. En caso de **contacto con la piel**: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. En **caso de Inhalación**: Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.
Antídoto: No se conoce antídoto específico.
TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: Realizar tratamiento base.
ECOTOXICIDAD: Prácticamente no tóxico para peces y algas. Muy toxico para microcrustáceos. Moderadamente tóxico para aves. Ligeramente tóxico para abejas. No asperjar, verter o eliminar el producto o sus envases en fuentes o cursos de agua.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
Triple lavado de los envases: Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en el equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA-CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es: 2 25604500, Santiago, Chile.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

LEXICON®

INSECTICIDA
Suspensión Concentrada (SC)

Lote N°:
Fecha de Vencimiento:

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.934

LEXICON® es un insecticida para el control de insectos, según lo indicado en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN:

Acetamiprid*…….....20% p/v (200 g/L)
Clorantraniliprol**……..…….....10% p/v (100 g/L)
Coformulantes c.s.p..... ..111,6% p/v
*(E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidina.
**3-bromo-N-[4-cloro-2-metil-6-(metilcarbomoil)fenil]-1-(3-cloropiridin-2-il) -1 H-pirazol-5-carboxamida.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Contenido Neto : X Litro

Importa y Distribuye:
UPL
UPL Chile S.A.
El Rosal 4610. Huechuraba,
Santiago Chile
ET1934-V002-OS4

Fabricado por:
UPL Limited
Plot N° 3101/1, 3101/2, 3101/3,
G.I.D.C., Ankleshwar, Gujarat,
India.

INSTRUCCIONES DE USO.
LEXICON® está compuesto por la mezcla de dos ingredientes activos, Acetamiprid y Clorantraniliprol. El primero es un insecticida sistémico y de contacto, que actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, actuando como un análogo de acetilcolina (ACo), que es un trasmisor químico natural de los impulsos. Corresponde a un neonicotinoide, que genera la hiperexitación del sistema nervioso, resultando en la muerte del insecto. Clorantraniliprol, es un insecticida eficaz que actúa por ingestión y contacto afectando los receptores de "Ryanodina". Esto producirá en los insectos susceptibles que dejen de alimentarse y luego mueran en 1 a 3 días.
CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Concentración	OBSERVACIONES
Tomate y Berenjena (invernadero)	Polilla del tomate (*Tuta absoluta*)	250 – 450 cc/ha	Aplicar al follaje, al inicio de aparición de larvas y repetir 7 días después de ser necesario. Realizar máximo 2 aplicaciones por temporada. Resguardar los periodos de carencia.
Manzano, Perales, Membrillos	Escama de San José (*Diaspidiotus perniciosus*)	20 – 30 cc/hL	Aplicar según monitoreo de la plaga con buena cobertura, realizar máximo 3 aplicaciones por temporada con una frecuencia máxima de 21 días, resguardando los periodos de carencia. Utilizar la dosis menor ante baja presión de la plaga, y la dosis mayor ante alta presión de la plaga.
	Polilla de la manzana (*Cydia pomonella*)	25 – 35 cc/hL	Aplicar según monitoreo de la plaga con buena cobertura. Realizar máximo dos aplicaciones foliares por generación a una misma especie en un mismo cultivo con una frecuencia máxima de 21 días.
	Polilla oriental (*Cydia molesta*)		Aplicar desde detectado el primer vuelo o desde detección en frutos. Realizar máximo tres aplicaciones por temporada con una frecuencia máxima de 21 días, alternadas con otros plaguicidas de distinto grupo químico e idealmente complementadas con otros plaguicidas u herramientas dirigidas al control de la plaga. Usar dosis mayor sólo ante alta presión de la plaga.
Nogales	Escama de San José (*Diaspidiotus perniciosus*)	20 – 30 cc/hL	Aplicar según monitoreo de la plaga con buena cobertura. Realizar máximo dos aplicaciones foliares por generación a una misma especie en un mismo cultivo con una frecuencia máxima de 21 días.
	Polilla de la manzana (*Cydia pomonella*)	25 – 35 cc/hL	Aplicar desde detectado el primer vuelo o desde detección en frutos. Realizar máximo tres aplicaciones por temporada con una frecuencia máxima de 21 días, alternadas con otros plaguicidas de distinto grupo químico e idealmente complementadas con otros plaguicidas u herramientas dirigidas al control de la plaga. Usar dosis mayor sólo ante alta presión de la plaga.
Almendro	Escama de San José (*Diaspidiotus perniciosus*)	20 – 30 cc/hL	Aplicar según monitoreo de la plaga con buena cobertura, realizar máximo 3 aplicaciones por temporada con una frecuencia máxima de 21 días, resguardando los periodos de carencia. Utilizar la dosis menor ante baja presión de la plaga, y la dosis mayor ante alta presión de la plaga.
	Polilla oriental (*Cydia molesta*)	20 – 35 cc/hL	Aplicar según monitoreo de la plaga con buena cobertura, realizar máximo 2 aplicaciones por temporada con una frecuencia máxima de 21 días, resguardando los periodos de carencia. Utilizar la dosis menor ante baja presión de la plaga, y la dosis mayor ante alta presión de la plaga.
Duraznero, Nectarines, Ciruelos, Plumcots, Pluots, Cerezos, Damasco.	Mosca de alas manchadas (*Drosophila suzukii*)	25 - 35 cc/hL	Aplicar desde que se detectan los primeros daños o desde inicio de susceptibilidad del cultivo (pinta o color pajizo). Realizar máximo 3 aplicaciones por temporada con una frecuencia de 7 días, alternado con plaguicidas de distinto grupo químico. Utilizar la dosis mayor solo ante alta presión de la plaga.
	Chanchito blanco (*Pseudococcus viburni*)		Aplicar desde detectado el primer ejemplar cercano al brote o fruto. Realizar máximo tres aplicaciones por temporada con una frecuencia máxima de 21 días, alternadas con otros plaguicidas de distinto grupo químico e idealmente complementadas con otros plaguicidas u herramientas dirigidas al control de la plaga. Usar dosis mayor sólo ante alta presión de la plaga.
	Polilla de la manzana (*Cydia pomonella*)		Aplicar desde detectado el primer vuelo o desde detección en frutos. Realizar máximo tres aplicaciones por temporada con una frecuencia máxima de 21 días, alternadas con otros plaguicidas de distinto grupo químico e idealmente complementadas con otros plaguicidas u herramientas dirigidas al control de la plaga. Usar dosis mayor sólo ante alta presión de la plaga.
	Polilla oriental (*Cydia molesta*)		Aplicar según monitoreo de la plaga con buena cobertura, realizar máximo 2 aplicaciones por temporada con una frecuencia máxima de 21 días, resguardando los periodos de carencia. Utilizar la dosis menor ante baja presión de la plaga, y la dosis mayor ante alta presión de la plaga.
	Escama de San José (*Diaspidiotus perniciosus*)	20 – 30 cc/hL	Aplicar según monitoreo de la plaga con buena cobertura, realizar máximo 3 aplicaciones por temporada con una frecuencia máxima de 21 días, resguardando los periodos de carencia. Utilizar la dosis menor ante baja presión de la plaga, y la dosis mayor ante alta presión de la plaga.
Cítricos (Limonero, Mandarino, Naranjo, Clementino, Tangerino, Tangelo y Pomelo)	Chanchito blanco de los cítricos (*Planococcus citri, Pseudococcus calceolariae, Pseudococcus longispinus*)	25 - 50 cc/hL	Aplicar al follaje, al inicio de movimiento de ninfas, según monitoreo, asegurando un buen cubrimiento. Usar la dosis menor sólo en condiciones de baja presión de la plaga y la mayor cuando se esperen condiciones de presión media a alta. Aplicar como máximo 2 veces en la temporada, cada 14 días entre aplicaciones.
	Escama roja de los cítricos (*Aonidiella aurantii*)		
	Mosquita blanca algodonosa de los cítricos (*Aleurothrixus floccosus*)		

APLICACIÓN: LEXICON® para un aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento de más de 8 km/h, no aplicar con altas temperaturas (mayores a 28°C) y dirigir la aplicación al follaje. Utilizar nebulizadora o pulverizadora con los siguientes mojamientos: Tomate y Berenjena: 500 – 1.000 L de agua/ha acorde al desarrollo fenológico del cultivo. Nogales, Pomáceas y Carozos: 1.500 – 2.500 L de agua/ha. Cítricos: 1.500 - 3.500 L de agua/ha. Para volúmenes mayores mantener dosis por concentración. **PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Antes de aplicar el insecticida **LEXICON®** revisar que el equipo de aplicación este limpio, calibrado y libre de depósitos de plaguicidas de aplicaciones anteriores. Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad de su capacidad y agregar la cantidad recomendada de **LEXICON®**, luego completar con agua hasta el nivel requerido, manteniendo siempre el sistema agitador funcionando. **COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. **INCOMPATIBILIDAD: LEXICON®** no presenta incompatibilidades conocidas con otros plaguicidas comúnmente utilizados. Como las formulaciones pueden cambiar y nuevas formulaciones pueden ser introducidas, se recomienda que los usuarios realicen una pequeña premezcla usando pequeñas cantidades de los productos y observe posibles efectos negativos (como floculación, precipitación). Evite la aplicación de muchos productos diferentes y mezclas de aplicación altamente concentradas. **FITOTOXICIDAD: LEXICON®** no es fitotóxico en los cultivos recomendados a las dosis, forma y condiciones recomendadas en la etiqueta. **PERÍODO DE CARENCIA (DÍAS):** Berenjena y Tomate: 7 días; Cereza, Ciruela: 10 días; Almendra, Nogal, Damasco, Durazno, Manzana, Membrillo, Nectarino, Pera; Plumcots y Pluots: 14 días. Cítricos: 14 días. Para cultivos de exportación, atenerse a las exigencias del país de destino. **TIEMPO DE REINGRESO:** Se recomienda aguardar 24 horas después de la aplicación para el ingreso de personas. No corresponde reingreso de animales, ya que los cultivos en que se recomienda no tienen como objetivo la alimentación animal. **Manejo de Resistencia:** Bajo ciertas condiciones naturales, existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o diferente sensibilidad a insecticidas, por lo tanto, esto puede ocurrir a **LEXICON®** como a otros productos de sus mismos grupos químicos. Estos ejemplares resistentes pueden llegar a ser dominantes después del uso repetido de este grupo de insecticidas y la población llegará a ser de difícil control con estos productos. Debido a que el desarrollo de resistencia no puede predecirse, el insecticida **LEXICON®** debe usarse como parte de las estrategias de manejo de resistencia establecidas para el cultivo. Para reducir o evitar la resistencia, se recomienda el uso de productos de diferente grupo químico y de un modo de acción diferente.

Acetamiprid	Grupo IRAC	4A
Clorantraniliprol	Grupo IRAC	28

®LEXICON es marca registrada.



USO EXCLUSIVO AG