CARACTERÍSTICAS:

ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR es un bioestimulante no microbiano en base a aminoácidos de origen animal. La formulación líquida con la mayor concentración de L-aminoácidos libres en el mercado, destacando aquellos que intervienen en la estimulación de la fotosíntesis, la formación de la clorofila y la superación del estrés.
ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR aporta macro y micronutrientes asegurando un correcto suplemento para la nutrición y bioestimulación de las plantas.

APLICACIÓN Y COMPATIBILIDAD:

Aplicar utilizando suficiente agua para mojar completamente el follaje de las plantas. En aplicaciones en cítricos, paltos, cebollas, ajos y crucíferas se recomienda adicionar un surfactante. ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR es compatible con la mayoría de los insecticidas, acaricidas, fungicidas y fitohormonales, en el caso de ser aplicado junto con fungicidas cúpricos, se recomienda bajar la dosis. Completar el volumen deseado. Mantener con agitación constante. No aplicar en ciruelos. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

PRECAUCIONES:

Manténgase alejado de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Manténgase en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C.

ADVERTENCIAS:

Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. Evite aplicaciones con temperaturas extremas.

ZOBERAMINOL PLUS FOLIAR

Nº DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
(Ver pie de etiqueta)

BIOESTIMULANTE NO MICROBIANO LÍQUIDO

COMPOSICIÓN	% p/v
L - α - aminoácidos libres	14,4
Nitrógeno total (N)	7,56
Nitrógeno orgánico (N)	1,87
Materia orgánica total	26,4
Materia seca: 23,1% p/p	

CONTAMINANTES:
Arsénico (As) ≤ 2 mg/kg (ppm) ; Mercurio (Hg) ≤ 0,20 mg/kg (ppm)
Cadmio (Cd) ≤ 0,50 mg/kg (ppm) ; Plomo (Pb) ≤ 2 mg/kg (ppm)
Cromo Hexavalente (Cr VI) ≤ 2 mg/kg (ppm) ; Níquel (Ni) ≤ 0,50 mg/kg (ppm)
Libre de *Escherichia coli* y *Salmonella spp*
Formulación: Suspensión

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

Solubilidad en agua a 20°C: 100%
pH (producto puro a 20°C): 5,5
Densidad a 20°C: 1140 g/L

Origen: España

DATOS DEL FABRICANTE
ZOBERBAC AGROCOMPANY S.L.
Polígono Industrial Vilanoveta - C/Ferrers 14
08812 Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Tel. +34 93 811 54 00
zoberbac@zoberbac.com - www.zoberbac.com

DATOS DEL IMPORTADOR
BIOAMERICA S.A.
Longitudinal Sur Km 50,
Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago - Chile
info@bioamerica.cl - www.bioamerica.cl

Contenido: 1 l

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS L/ha	CONCENTR. cc/100 L
Uva de Mesa, Uva Vinífera, Kiwi, Manzanos, Nogal, Avellano, Perales Carozos, Paltos, Cítricos Frambuesa, Frutillas Arándanos	· Brotación, Floración y crecimiento de frutos · Post cosecha · Junto a los fitosanitarios · Antes o después de estrés	2 - 4	150 - 200
Huertos en formación y Viveros	Cada 15 a 20 días desde inicio de brotación.	2 - 3	200 - 300
Tomate, Pepino, Pimiento, Melón, Zapallo, Sandía, Apio, Lechuga, Espinaca	· Almácigos. · 7 días postransplante. · Cada 10 a 12 días. · Antes o después de estrés.		300
Cebolla, Ajo	· Desde transplante. · Desde segunda hoja cada 10 a 15 días.		
Maíz	· Desde estados V4 a V8. · Emisión de seda. · Antes o después de estrés.		
Trigo, Avena, Cebada	· Inicio Macolla. · Hoja bandera.		
Papa	· Desde emergencia. · Inicio de tuberización, y repetir cada 10 - 12 días. · Aplicar antes o depués de estrés.		
Otros Cultivos	· Antes o después de estrés. · En los períodos de máximo requerimiento energético. · Cuando existe mayor índice de área foliar.		

Nº DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

LEER LA ETIQUETA ANTES DE USAR
AGITAR BIEN ANTES DE USAR

09 - 2025