

Fertilizante inorgánico a base
de Potasio complejo con
azúcares ácidos

DEFENDER
K

| RIQUEZAS GARANTIZADAS | % p/p | % p/v |
|--|-------|-------|
| Potasio* (K ₂ O) | 25,0 | 36,5 |
| *Complejado con ácidos tricarbóxicos. | | |
| PARAMETROS FÍSICO QUÍMICOS | | |
| Solubilidad en agua a 20° C: 100% | | |
| pH: 6,46 | | |
| Densidad a 20° C: 1460 g/L | | |
| ELEMENTOS ACOMPAÑANTES: Arsénico (As) < 10 mg/Kg; Cadmio (Cd) < 0,5 mg/Kg; Cromo Hexavalente (CrVI) < 0,5 mg/Kg; Mercurio (Hg) < 0,5 mg/Kg; Níquel (Ni) < 20 mg/Kg; Plomo (Pb) < 10 mg/Kg | | |
| Formulación: Solución líquida | | |

CONTENIDO: 20 l

 **BOAMERICA**

FERTILIZANTE INORGÁNICO A BASE DE POTASIO COMPLEJADO CON AZÚCARES ÁCIDOS



CARACTERÍSTICAS:

DEFENDER POTASIO es un producto rico en potasio. El potasio se encuentra formando ligado con ácidos orgánicos que, aseguran su absorción y translocación por la planta (el potasio circula por el interior de la planta formando complejos con ácidos orgánicos). Su empleo favorece la absorción de calcio y magnesio. Una característica importante es su pH, que favorece la compatibilidad con otros productos. Los agentes complejantes son diferentes tipos de ácidos tricarbóxicos que forman sus respectivas sales con el potasio (tricarbóxilatos de potasio).

RECOMENDACIONES DE USO:

| CULTIVO | MOMENTO DE APLICACIÓN | DOSIS l/ha | CONCENTRACIÓN cc/100 l |
|---------------------------------|--|------------|------------------------|
| Vides | Aplicar desde inicio de pinta y repetir cada 10 días. | 3,0 - 5,0 | 200 - 300 |
| Carozos , Cerezos | Aplicar 3 a 4 veces desde endurecimiento en adelante. | | |
| Pomáceas | Aplicar 60, 40 y 20 días antes de la cosecha. | | |
| Cítricos | 3 a 4 aplicaciones desde fruto formado, cada 10 a 15 días. | | |
| Arándanos, Frambuesa, Frutillas | Aplicar desde inicio de quiebre de color a precosecha. | | |
| Tomate | Aplicar durante crecimiento de frutos, repitiendo cada 15 a 20 días. | 2,0 - 3,0 | 200 - 300 |
| Melón, Zapallo, Sandía | | | |
| Papa | | | |

Las dosis por riego están entorno a los 10 l/ha repartidos en 2-3 aplicaciones a partir del cuajado.

ADVERTENCIAS:

Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

PRECAUCIONES:

Manténgase en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35 °C.
Manténgase alejado de los niños.
Manténgase lejos de alimentos bebidas y piensos.

AGITAR ANTES DE USAR.

CONTENIDO NETO: 20 l

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:

BIOAMERICA

BIOAMERICA, S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago – Chile
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

Nº DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

