

HURRICANE® 70 WP

INSECTICIDA POLVO MOJABLE (WP)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.717

HURRICANE® 70 WP es un insecticida con acción sistémica e ingestión, recomendado para el control de las plagas descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Acetamiprid (*)	70% p/p (700 g/kg)
Cofomulantes, c.s.p.	100% p/p (1 kg)

(*) (E)-N¹-[[6-cloro-3-piridil]metil]-N²-ciano-N¹-metilacetamida

<< LEA ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A.
Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A.
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPA - CHILE

ZHEJIANG LONGYOU EAST ANASAC CROP SCIENCE CO., LTD.
Town South Donghua District, Longyou County,
ZHEJIANG - CHINA

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

HURRICANE® 70 WP, es un insecticida cuyo ingrediente activo Acetamiprid pertenece al grupo químico de los neonicotinoides. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. **Durante la preparación** del polvo mojable usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma sin forro. **Durante la aplicación** usar como protección traje impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma sin forro. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

Información ecotoxicológica: **HURRICANE® 70 WP**, es prácticamente no tóxico para peces y abejas, ligeramente tóxico para microcrustáceos acuáticos y aves.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DE PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

<< PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Diluir con mediana cantidad de suero salino; realizar aspiración nasogástrica. Evaluar la real necesidad del lavado gástrico. Finalmente administrar 30 gramos de carbón activado, suspendidos en 500 cc de agua. Si no se ha presentado diarrea administre un laxante salino.

Primeros auxilios:

En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, consultar a un médico. **En caso de inhalación:** Retirar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo a un lugar fresco manteniéndolo en reposo. **En caso de ingestión:** No provocar vómitos, ya que pueden causarse alteraciones pulmonares. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Luego trasladar al afectado al hospital más cercano. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto. **En todos los casos** trasladar inmediatamente al hospital más cercano.

Síntomas de intoxicación: fatiga, reducción de la actividad motora, anomalías al caminar, disminución de temperatura, dilatación de pupilas y una posible disminución de la capacidad respiratoria.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **HURRICANE® 70 WP**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes, fertilizantes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca registrada de AGRICOLA NACIONAL S.A.C. E I.



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

HURRICANE® 70 WP es un insecticida que actúa en forma sistémica, contacto e ingestión. Está recomendado para el control de las plagas descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso Terrestre

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Peral, Manzana, Membrillo	Polilla de la manzana, Chanchito blanco, Psilido del peral, Trips de California, Escama De San José, Pulgones (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis citricola</i>)	12 g/hl	Aplicar al detectar la plaga, con buen cubrimiento. En árboles adultos aplicar un mínimo de 230 g/ha. Volumen de agua sugerido: 1.500 a 2.000 L/ha. Para volúmenes inferiores a 1.900 L/ha respetar dosis mínima por hectárea.	1
	Langostino del manzano	5 g/hl	Aplicar al detectar la plaga, con buen cubrimiento, aplicar mínimo 85 g/ha. Volumen de agua sugerido: 1.500 a 2.000 L/ha.	
Vides	Pulgón (<i>Aphis illinoisensis</i> , <i>Myzus persicae</i>), Trips de California, Chanchito blanco (<i>Pseudococcus viburni</i> , <i>P. longispinus</i> , <i>Planococcus citri</i>)	15 g/hl	Para trips aplicar al inicio de floración. Para pulgón aplicar al detectar la plaga. Para chanchito blanco aplicar según monitoreo de la plaga, con buen cubrimiento. Volumen de agua sugerido: 1.500 a 2.000 L/ha.	3
Cerezo, Ciruelo, Damasco, Duraznero, Nectarino	Polilla oriental, Pulgón (<i>Aphis craccivora</i> , <i>Myzus persicae</i>), Trips de California, Escama de San José, Chanchito blanco (<i>Pseudococcus viburni</i> , <i>P. longispinus</i> , <i>P. calceolariae</i>)	12-15 g/hl	Aplicar al detectar la plaga y para el caso de polillas según monitoreo con trampa de feromona. Para trips iniciar aplicaciones desde botón rosado. Para chanchito blanco y escama de San José aplicar según monitoreo de la plaga, con buen cubrimiento. Volumen de agua sugerido: 1.500 a 2.000 L/ha.	Cerezo: 1 Nectarino: 5 Damasco, Duraznero: 7 Ciruelo: 21
Almendro	Escama de San José	15 g/hl	Aplicar según monitoreo de la plaga con buen cubrimiento y dirigido a la primera generación. Volumen de agua sugerido: 2.000 L/ha.	13
Naranja, Limonero, Pomelo, Mandarino, Clementino, Tangerino, Tangelo	Mosquita blanca, Pulgón (<i>Aphis citricola</i> , <i>Myzus persicae</i>)	15 g/hl	Aplicar al detectar los primeros ejemplares de la plaga, con buen cubrimiento. Volumen de agua sugerido 1.500 a 2.000 L/ha, para mandarina: 1.500 L/ha.	Naranja, Pomelo, Tangerino, Tangelo: 10 Limon, Mandarino, Clementina: 15
Naranja, Limonero, Clementina	Chanchito blanco (<i>Pseudococcus viburni</i> , <i>P. calceolariae</i> , <i>P. longispinus</i> , <i>Planococcus citri</i>)	15 g/hl		
Mandarino	Chanchito blanco (<i>Pseudococcus viburni</i> , <i>P. calceolariae</i> , <i>P. longispinus</i>)	15 g/hl		
Naranja	Conchuela acanalada	15 g/hl	Aplicar al detectar los primeros ejemplares de la plaga, con buen cubrimiento. Volumen de agua sugerido: 3.000 L/ha.	10
Granados	Pulgón negro, Pulgón verde del duraznero, Chanchitos blancos (<i>Pseudococcus viburni</i> , <i>P. longispinus</i>), Mosquita blanca (<i>Aleurothrixus floccosus</i> , <i>Siphoninus phillyreae</i>).	12-15 g/hl	Aplicar según monitoreo, de preferencia dirigido a la primera generación. Volumen de agua sugerido: 1.500 a 2.000 L/ha.	60
Pimiento, Tomate	Minador de la alcachofa, Mosquita blanca, Pulgón (<i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i>), Trips de California, Minador (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	13-15 g/hl	Aplicar al detectar los primeros ejemplares de la plaga, con buen cubrimiento. Aplicar un mínimo de 100 g/ha y un máximo de 150 g/ha. Volumen de agua sugerido: 400 a 650 L/ha.	1
Remolacha	Langostino (<i>Ribautiana tenerima</i>), Pulgón (<i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i>)	110 g/ha	Aplicar al detectar los primeros ejemplares de la plaga, con buen cubrimiento. Repetir en caso de reinfestación. Volumen de agua sugerido: 400 a 650 L/ha.	21
Papa	Minador de la alcachofa, Mosquita blanca, Pulgón (<i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i>), Trips de California	90-110 g/ha	Aplicar al detectar los primeros ejemplares de la plaga, con buen cubrimiento. Repetir en caso de reinfestación. Volumen de agua sugerido: 400 a 650 L/ha.	7
Semilleros De Alfalfa	Langostino (<i>Ribautiana tenerima</i>), Pulgón (<i>Aphis craccivora</i> , <i>Myzus persicae</i>), Trips de California	140 g/ha o 20 g/hl	Aplicar al detectar la plaga, con buen cubrimiento. Para control de trips en semilleros aplicar en prefloración. Volumen de agua sugerido: 400 a 650 L/ha.	NC
Trigo	Pulgón de la avena	30-60 g/ha	Aplicar al detectar los primeros ejemplares de la plaga, con buen cubrimiento. Volumen de agua sugerido 150 a 200 L/ha.	60
Olivo	Mosquita blanca del fresno, Conchuela hemisférica	15 g/hl	Aplicar según monitoreo de la plaga, con buen cubrimiento. Volumen de agua sugerido 1.800-2.500 L/ha. Para control de escama blanca de la hiedra realizar una aplicación por temporada con un volumen de 2.000 L/ha. Para conchuela hemisférica aplicar con 2.500 L de agua/ha. Para conchuela negra aplicar con 1.800 L de agua/ha.	90
	Conchuela negra del olivo	12 g/hl		
	Escama blanca de la hiedra	12-15 g/hl		
Repollo	Polilla del repollo Pulgón de las brásicas	100 g/ha	Aplicar según monitoreo de la plaga, con buen cubrimiento. Volumen de agua sugerido: 400 a 650 L/ha.	45
Brócoli	Pulgón de las brásicas	15 g/hl	Aplicar según monitoreo de la plaga, con buen cubrimiento. Volumen de agua sugerido 500 L/ha.	14
Nogal	Pulgón del nogal	12-15 g/hl	Aplicar según monitoreo de la plaga, con buen cubrimiento. Volumen de agua sugerido 3.000 L/ha. Para escama de San José realizar 1 aplicación por temporada. Para polilla de la manzana aplicar 2 veces por temporada.	20
	Escama de San José Polilla de la manzana	15 g/hl		
Avellano Europeo	Pulgón del avellano europeo	12 g/hl	Aplicar al detectar la plaga, con buen cubrimiento. Volumen de agua sugerido 1.500 L/ha.	7
Raps	Pulgón de las brásicas	60 g/ha	Aplicar según monitoreo de la plaga, con buen cubrimiento. Volumen de agua sugerido 150 a 200 L/ha.	NC

NC: No corresponde

Cuadro de Instrucciones de Uso Aéreo:

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Raps	Pulgón de las brásicas	60 g/ha	Aplicar según monitoreo de la plaga, con buen cubrimiento.	NC
Trigo	Pulgón de la avena	30-60 g/ha	Aplicar al detectar los primeros ejemplares de la plaga, con buen cubrimiento.	60
Pimiento, Tomate	Minador de la alcachofa, Mosquita blanca, Pulgón (<i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i>), Trips de California, Minador (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	13-15 g/hl	Aplicar al detectar los primeros ejemplares de la plaga. Aplicar un mínimo de 100 g/ha y un máximo de 150 g/ha.	1
Papa	Minador de la alcachofa, Mosquita blanca, Pulgón (<i>Aphis fabae</i> , <i>Myzus persicae</i>), Trips de California	90-110 g/ha	Aplicar al detectar los primeros ejemplares de la plaga, con buen cubrimiento. Repetir en caso de reinfestación.	7
Avellano Europeo	Pulgón del avellano europeo	180 g/ha	Aplicar según monitoreo de la plaga.	7
Almendro	Escama de San José	300 g/ha	Aplicar según monitoreo de la plaga dirigido a la primera generación.	13
Nogal	Pulgón del nogal	360-450 g/ha	Aplicar según monitoreo de la plaga	20
	Escama de San José, Polilla de la manzana	450 g/ha		

NC: No corresponde

Instrucciones de Uso:

- Para aplicaciones aéreas emplear un volumen de agua de 40 a 60 L/ha.
- En pomáceas aplicar un máximo de 3 veces por temporada. En almendro, avellano europeo y brócoli aplicar como máximo 1 vez por temporada y para el resto de los cultivos realizar como máximo 2 aplicaciones por temporada. Para todos los cultivos las aplicaciones se deben realizar con un intervalo mínimo de 21 a 25 días.
- En vid para control de chanchito blanco se recomienda usar junto con surfactante coadyuvante.
- Usar dosis menor con baja presión de la plaga y dosis mayor con presiones media a altas.
- Para una mejor acción se recomienda aplicar en horas de menor temperatura y viento, temprano en la mañana o al atardecer. No aplicar durante las horas de más calor (sobre 28 °C).
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 km/h.
- Se debe aplicar sin agua libre en la superficie del follaje.
- No aplicar si existe riesgo de heladas o lluvias inminentes.

Precauciones para aplicación aérea: Se debe evitar deriva de la aplicación, por lo que se recomienda aplicar

temprano en la mañana o al atardecer. En caso de aplicaciones aéreas en periodo de polinización y en cultivos atrayentes para insectos polinizantes, retirar colmenas previo a la aplicación.

Preparación de la mezcla: Poner agua en el estanque del equipo aplicador hasta la mitad, agregar la dosis requerida de **HURRICANE® 70 WP**, manteniendo el agitador en marcha, luego rellenar con agua hasta completar el volumen deseado. Aplicar la mezcla siempre con el agitador en funcionamiento: lavar el equipo prolijamente antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con los residuos.

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común.

Incompatibilidad: Sólo es incompatible con aquellos productos fitosanitarios de marcada reacción alcalina o fuertemente oxidantes.

Fitotoxicidad: **HURRICANE® 70 WP** no es fitotóxico en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones de la etiqueta. En algunas variedades de nectarinos y de perales asiáticos puede producirse un síntoma de daño parcial en las hojas. Se recomienda probar previamente en pequeña escala.

Tiempo de reingreso: Esperar 12 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.



CUIDADO

