

28 cm.

Helvetica Neue Condensed - Cuerpo 8

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Amicarbazona, ingrediente activo de **DINAMIC® 70 WG**, pertenece al grupo químico de las Triazolonas. Se debe evitar la ingestión, inhalación, contacto con la piel, proyecciones en los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación usar equipo de protección adecuado como: guantes impermeables, botas de goma, protector facial y delantal impermeable. Durante la aplicación usar botas de goma, guantes impermeables, mascarilla para polvos, protector facial y overol impermeable. No aplicar con viento ni trabajar en la niebla de la solución asperjada. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Después de la aplicación lave con abundante agua de la llave todas las partes del cuerpo y ropa que puedan haber tenido contacto con el producto. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, bajo llave en un lugar fresco y seco. Los envases vacíos eliminarlos lejos de un punto de agua, en un lugar designado por la autoridad competente.

SÍNTOMAS DE INTOXICACION.

No existe información sobre síntomas de intoxicación específicos para el ser humano. En animales se observó reducción de la actividad, descarga nasal, lagrimeo, salivación, manchas en nariz y boca, alteración en el color de la orina.

PRIMEROS AUXILIOS.

Si el producto es ingerido, no provocar el vómito, dar a beber uno o dos vasos de agua con 10 g. o más de carbón activado. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Llame a un médico. Si hay **contacto con los ojos**, mantener los ojos abiertos y lavar profusamente con agua por 15 a 20 minutos. Retirar los lentes de contacto en caso de uso, después de 5 minutos continuar lavando los ojos. Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Llame a un médico especialista. Si es inhalado, traslade a la persona al aire fresco. Llame al médico.

Contacto con la piel: usar abundante agua de la llave. Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si la irritación persiste, llame a un médico.

Antídoto: No existe antídoto específico para el producto.

Tratamiento médico de emergencia: Aplicar tratamiento base.

ECOTOXICIDAD: Prácticamente no tóxico a peces, ligeramente tóxico a aves y virtualmente no tóxico a abejas. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA, o a RITA - CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es: 2 25604500, Santiago, Chile.

NOTA AL COMPRADOR:

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

Helvetica Neue Condensed - Cuerpo 8

DINAMIC® 70 WG
HERBICIDA
GRANULADO DISPERSABLE
(WG)

Lote N°

Fecha de vencimiento:

Autorización del
Servicio Agrícola
y Ganadero N° 3538

DINAMIC® 70 WG es un herbicida sistémico, usado pre o post-emergencia, para el control de malezas gramíneas y dicotiledóneas anuales, dicotiledóneas perennes y arbustivas de germinación o semilla en post-plantación de Pinos y Eucaliptos y para el control de Pre-siembra incorporado (PSI) o de Pre-emergencia (PRE) del cultivo y de la maleza en Maíz, descritas en el área de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

*Amicarbazona.....70% p/p (700 g/kg)

Coformulantes, c.s.p.....100 % p/p (1 kg)

*4-amino-N-terc-butil-4,5-dihidro-3-isopropil-5-oxo-1,2,4-1H-triazol-1-carboxamida.

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Importa y Distribuye:
Arysta LifeScience Chile S.A.
El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago, Chile.
ET 3538V-009-01
OS1

Fabricado por:
Arysta LifeScience North America LLC
4524-A Valnorth Drive, Valdosta, GA USA 31602, EE.UU.
UPL Sud África Pty Ltd.
PO Box 1726, Mtunt Edgecombe, 4300, Sud África
UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.
Rodovia Sorocaba - Pilar do Sul km 122 -
Salto de Pirapora/SP - 18160-000 CNPJ:
Brasil

**CUIDADO**

Helvetica Neue Condensed - Cuerpo 7

INSTRUCCIONES DE USO.

DINAMIC® 70 WG es un herbicida sistémico pre o post-emergente, con actividad foliar y radicular, aplicado en post-plantación de Pino y Eucalipto, para el control de malezas hoja ancha y ancha, anuales, bianuales perennes y arbustivas propagadas por semillas, durante la germinación. En Maíz, aplicado de Pre-siembra incorporado (PSI) o de Pre-emergencia (PRE) del cultivo y de la maleza, para el control de malezas hoja ancha y gramíneas, anuales y perennes propagadas por semilla. Es un inhibidor de la fotosíntesis.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES
Pinos y Eucaliptos	Control Pre-emergente y Post-emergente de: Chépica, Pasto ovillo, Ballica, Cardo negro, Hierba del Chanco, Alfalfa chilota, Soncho, Lengua de serpiente, Senecio, Hierba mora, Hualputra, Nihue, Siete venas.	1,5 a 2,0	Dirigir las aplicaciones sobre suelo desnudo o sobre las malezas gramíneas recién emergidas o juveniles (2 a 5 hojas) y dicotiledóneas hasta estado de 2 a 3 hojas. Los volúmenes de agua a utilizar son de 100 a 200 L de agua/ha. Evite la deriva sobre los Pinos y Eucaliptos. Tanto en pre como post-emergencia, usar la dosis menor para suelos livianos o medios y la dosis mayor para suelos arcillosos. Para Nihue y Siete venas usar la dosis máxima.
	Control post-emergente de: Chépica, Pasto ovillo, Cardo negro, Soncho, Lengua de serpiente, Senecio, Hierba mora, Hualputra, Nihue.	1,5 (*)	
Maíz	Control de Pre-siembra incorporado (PSI) de: Quinguilla, Verdolaga, Bledo, Tomatillo, Chamico, Suspiro, Hualcacho, Maicillo (Supresión), Chufa (Supresión), Yujo, Rabano Clonqui, Ambrosia, Bolista del pastor, Sanguinaria, Malvilla.	0,4 a 0,6 (**)	La aplicación de Pre-siembra (PSI) debe ser incorporado superficialmente (3 - 5 cm) con una labor de rastraje o cultivador. Si la aplicación es realizada en Pre-emergencia (PRE), ésta se debe realizar en forma oportuna inmediatamente después de la siembra, una vez la semilla haya sido tapada. La aplicación de Pre-emergencia (PRE) debe ser incorporado mediante riego por aspersión, pivote, o cuando se prevén lluvias permitiendo que el producto se mueva a la zona de germinación. Utilizar la dosis mayor cuando exista alta presión de malezas en el predio considerando las dosis de 0,4 a 0,6 kg/ha en suelos con materia orgánica < al 5% y las dosis de 0,8 a 1 kg/ha en suelos con materia orgánica > al 5%. Para Hualcacho y supresión de Maicillo y Chufa, se debe usar la dosis mayor. Utilizar un mojado de 200 - 250 L agua/ha.
	Control de Pre-siembra incorporado (PSI) de: Ambrosia, Bledo, Chamico, Quinguilla, Verdolaga, Tomatillo, Clonqui, Hualcacho, Rabano, Bolista del pastor, Sanguinaria, Malvilla. Control de Pre-emergencia (PRE) (del cultivo y de la maleza) de: Ambrosia, Bledo, Chamico, Quinguilla, Rabano, Verdolaga, Tomatillo.	0,8 a 1	
	Control de Pre-emergencia (PRE) (del cultivo y de la maleza) de: Hualcacho, Pasto de la perdiz, Pata de gallina.	0,8	

APLICACIÓN: Preparación de la mezcla: Llenar el estanque hasta la mitad con agua, luego agregar la dosis de **DINAMIC® 70 WG** requerida, manteniendo el agitador en marcha y en caso de mezcla con otro herbicida, agregarlo a continuación y completando finalmente con el volumen de agua total.

El producto debe ser aplicado a través de pulverizaciones terrestres y con buen cubrimiento. Tome las debidas precauciones para evitar la deriva, sobre las plantaciones forestales, cultivos adyacentes, por ejemplo, aplicar sin viento, usar pantalla protectora, boquilla de espuma o antideriva si fuese necesario. Aplique una vez en la temporada.

Otras informaciones importantes: Aplicar en suelo bien preparado, mullido, firme, libre de terrones o rastros con suficiente humedad. Use semilla de buen % de germinación y vigor, de la temporada sin daño. La siembra debe contemplar que la semilla quede bien tapada a una profundidad mínima de 1,5 cm. Evite siembras e incorporación del herbicida muy profundas ya que podría afectar el control de malezas y la selectividad del cultivo. No sobredosifique y evite el traslape de la aplicación ya que la mayor dosificación aumenta el potencial daño al cultivo para las condiciones de suelo utilizadas. Use la dosis correcta según textura, materia orgánica y pH del suelo. Suelos desuniformes en uno o más de estos parámetros son considerados variables y podrían presentar sectores con daños localizados, especialmente en aquellos con textura de suelo gruesa, liviana, baja en materia orgánica y/o con pH alcalino. No aplicar en suelos con contenido de materia orgánica inferiores a 2% y/o suelos livianos, arenosos o texturas gruesas. No aplicar en suelos con pH > 7,4. Evite aplicar bajo condiciones de estrés antes, durante o después del establecimiento del cultivo. Factores de estrés como clima, enfermedades, daño de insectos, fertilidad, calidad de siembra y semilla, pueden generar un daño temporal que se puede manifestar como una reducción en el desarrollo del cultivo, amarillez y/o quemadura foliar. Condiciones climáticas de temperaturas frías (día y noche), condiciones de exceso de humedad, anegamientos, lluvias intensas y prolongadas durante el periodo de germinación y emergencia del cultivo, pueden afectar el normal desarrollo del cultivo y el control de malezas.

ROTACIONES: Si la siembra de Maíz aplicada con **DINAMIC® 70 WG** falla, solo puede sembrarse Maíz en forma inmediata. Para suelos con contenidos de materia orgánica mayor a 5%, en la rotación se pueden establecer los siguientes cultivos invernales transcurridos 6 meses de la aplicación: Avena, Trigo, Ballica, Raps, Trébol y esperar 1 año para siembra de primavera y verano de: Achicoria, Remolacha azucarera, Poroto, Tomate industrial, Cebada.

El uso continuado de herbicidas pertenecientes al grupo de las Triazolonas con un mismo mecanismo de acción puede contribuir para un aumento de población de malezas resistentes. Como práctica de manejo de resistencia de malezas, debiera procurar aplicar herbicidas con diferentes modos de acción, debidamente registrados para el cultivo. No habiendo productos alternativos, se recomienda una rotación de cultivos que posibilite el uso de herbicidas con diferentes mecanismos de acción. Para mayor información consulte a nuestro departamento técnico.

COMPATIBILIDADES: Para ampliar el espectro de acción y controlar malezas en estado de crecimiento juvenil, la aplicación de **DINAMIC® 70 WG** se puede complementar con otros herbicidas. Es recomendable hacer pruebas previas de compatibilidad para mezclas con otros productos. Para el caso de mezclas consultar a nuestro Departamento Técnico.

(*) Para ampliar el espectro de control de malezas, puede usarse con otros herbicidas como Roundup® en sus diversas formulaciones.

(**) Para ampliar el espectro de acción de la aplicación, **DINAMIC® 70 WG** se puede combinar con otros herbicidas como Guardian® y Propionit® 720 EC o Acetoclor. Para otras mezclas, consultar a nuestro Departamento Técnico.

INCOMPATIBILIDADES: Es incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: Siguiendo las instrucciones de uso de esta etiqueta este producto no es fitotóxico. Aplicaciones en suelos con contenidos bajos de materia orgánica y/o suelos arenosos en Maíz, puede producir cierto amarillamiento en la punta del coleoptilo y hojas. Condiciones extremas de estrés, sobredosis, suelos de baja materia orgánica y/o livianos-arenosos, lluvias intensas y prolongadas, suelos anegados, pueden afectar el stand de plantas. No utilizar **DINAMIC® 70 WG** en Maíz dulce y palomitas de maíz. Para semilleros de maíz, antes de usar consulte a nuestro Departamento Técnico.

PERIODO DE CARENIA: No corresponde establecer periodo de carencia por la época y forma de uso.

TIEMPO DE REINGRESO: Las personas no deben reingresar al área tratada antes de 12 horas de la aplicación. No corresponde establecer tiempo de reingreso para animales por el tipo de cultivo en el cual se aplica el producto.

DINAMIC® es marca registrada, Propionit® es marca registrada de Arysta LifeScience; Roundup® es marca registrada de Monsanto Company; Guardian® es marca registrada Monsanto Company.

16,5 cm.

2,47 cm.

PANTONE 347 C

NEGRO 100%