

Fosfito y Magnesio  
de rápido efecto

FOSFIMAX  
Mg

COMPOSICIÓN	% p/p	% p/v
Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	40,0	56,8
Magnesio (MgO)	10,0	14,2

Solubilidad a 20°C: 100%  
pH (solución al 1%): 2,22  
Densidad (g/ml): 1,42

**CONTENIDO EN METALES PESADOS:**  
Cadmio (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Cromo(Cr) ≤ 5 mg/kg; Plomo(Pb) ≤ 5 mg/kg, Mercurio(Hg) ≤ 0,5 mg/kg; Arsénico(As) ≤ 10 mg/kg.

CONTENIDO: 5l  
BOAMERICA

# FOSFITO Y MAGNESIO DE RÁPIDO EFECTO



## CARACTERÍSTICAS:

Bioestimulante desarrollado para la prevención y corrección de carencias de magnesio, que funciona como activador de las plantas, así como favorece el desarrollo radicular y potencia los procesos de floración, cuajado y maduración de frutos. **FOSFIMAX Mg** aporta a la planta una alta cantidad de magnesio, el principal constituyente de la molécula de clorofila, lo que optimiza la fotosíntesis. El magnesio mejora la absorción de otros elementos como el fósforo y actúa como activador enzimático. **FOSFIMAX Mg** aporta a la planta un alto contenido de fósforo en forma de ión fosfito. **FOSFIMAX Mg** tiene acción sistémica: se absorbe rápidamente y se distribuye a todas las partes de la planta.

## RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	CONCENTRACIÓN cc/100l	OBSERVACIONES
<b>Hortalizas</b>		Hacer la primera aplicación al momento de trasplante. Hacer entre 2 y 4 aplicaciones adicionales durante el ciclo del cultivo.
<b>Vides y Kiwis</b>		Aplicar al inicio de actividad vegetativa y repetir 3-4 aplicaciones a lo largo del cultivo a intervalos de 15-20 días.
<b>Berries</b> (Arándanos, Frambuesas, Fresas, etc...)	200 - 300	Aplicar en prefloración, cuajado y desarrollo de frutos.
<b>Pomáceas, Carozos, Cerezos, Nogales</b>		Aplicar en prefloración, cuajado y desarrollo de frutos.
<b>Paltos y Cítricos</b>		Aplicar al inicio de la actividad vegetativa, prefloración y desarrollo de frutos.
<b>Industriales</b>	300 - 500	Repartir un mínimo de 3-4 aplicaciones a lo largo del cultivo.

## MODO DE EMPLEO:

Realizar aplicaciones foliares o bien diluir en el agua de riego. Aplicar en intervalos de 2-3 semanas usando suficiente agua para cubrir el cultivo.

## COMPATIBILIDAD:

**FOSFIMAX Mg** es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas excepto con dicofol, dimetato, aceites y productos cúpricos. Para aplicación con fitosanitarios, observar las recomendaciones de mezcla del fabricante, y si es posible hacer una prueba de compatibilidad en un volumen pequeño.

## ADVERTENCIAS:

Toda la información recogida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

## PRECAUCIONES:

Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

## AGITAR ANTES DE USAR.

## FECHA DE CADUCIDAD:

5 años desde la fecha de fabricación.

## LOTE Y FECHA DE FABRICACIÓN:

Ver información en el envase.

## CONTENIDO NETO: 5l



## IMPORTADOR:

**BIOAMERICA**

BIOAMÉRICA, S.A.  
Langueñal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2  
Paine, Santiago - Chile  
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl  
www.bioamerica.cl

## FABRICADO POR:

 **FUTURECO**  
bioscience

FUTURECO BIOSCIENCE S.A.  
Av del Gudi, 19-23, Pl. Sant Pere de Molant  
08799 Olerdola, Barcelona - España  
www.futurecobioscience.com  
corporation@futurecobioscience.com