

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicar al observar la presencia o tránsito de roedores.

USO	LUGAR	DOSIS
Casas, edificios, hoteles, hospitales, restaurantes, lugares públicos, fábricas de alimentos, bodegas, mataderos, frigoríficos, packings, haras, planteles avícolas y porcinos, lecherías, criaderos y otros.	Interiores como cocinas, despensas, entretechos, bodegas y lugares con alta oferta de otros alimentos atractivos para los roedores.	RATAS: 1 sachet cada 5 - 10 metros lineales. LAUCHAS O RATONES: 1 sachet 2 - 4 metros lineales.
Reponer los cebos consumidos en forma continua, hasta que cese el consumo. Para un efectivo control de roedores, utilice siempre las ventajas complementarias de los productos Rastop Minibloque, Rastop Molienda, Rastop Pasta.		

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños y personas inexpertas.

No almacenar ni transportar junto con alimentos. Durante su aplicación no debe beber, comer ni fumar. Usar guantes para manipular el producto. Destruir el envase y restos de productos en forma segura, una vez utilizado. Después de aplicar lavarse con abundante agua y jabón. Evitar contacto con la piel. Conservarse el producto en envase original etiquetado y cerrado en un lugar fresco, seco y bajo llave. En caso de intoxicación mostrar la etiqueta o el envase al personal de salud. Inutilizar y eliminar los envases de acuerdo con instrucciones de las autoridades competentes.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación gástrica, diarrea, acidosis metabólica, irritación dermal y ocular.

PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión: Consultar en centro asistencia más cercano. No provoque vómito.

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente y de manera prolongada con agua limpia, consultar al médico.

MECANISMO DE ACCIÓN: Bromadiolona es un potente anticoagulante sanguíneo, actúa produciendo hemorragias internas, anemias y posterior muerte en roedores. Su mecanismo está basado en la disminución de la producción hepática de protrombina, por lo anterior, no se produce fibrina que es una proteína insoluble que participa en el proceso de coagulación. Su acción antagónica a la vitamina K, es prolongada lo que aumenta el éxito del control.

RASTOP PELLET es un raticida de última generación. Mata todo tipo de ratas y ratones al consumir su dosis letal en una sola ingesta, incluso en aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales. La muerte de los roedores es en pocos días sin producir rechazo en la colonia. Posee una fórmula muy apetecida por los roedores debido a su atractivo olor, sabor y frescura.

Se aconseja colocar **RASTOP PELLET** dentro de tubos o cajas que permitan el acceso exclusivo de los roedores. Los mismos se sienten más protegidos para alimentarse. Al cesar la actividad de los roedores, destruir los restos del cebo y los recipientes. Para prevenir nuevas invasiones, mantener algunos cebaderos en forma permanente.



EN CASO DE EMERGENCIA
COMUNICARSE CON CENTRO
TOXICOLÓGICO RITA CHILE
AL 2 2777 1994 (STGO).

HORARIO DE ATENCIÓN
24 HORAS.

Fabricado por **COLKIM S.R.L.**

Via piemonte 50-40064,

Ozzano Emilia, Italia.

Importado y Distribuido por **Anasac Ambiental S.A.**

Almirante Pastene 300,

Providencia, Stgo. Chile

WWW.ANASACJARDIN.CL



Para interiores
50 g.
Sachet 25 g. aprox.
Contenido:

Pellet



RASTOP

RASTOP



Pellet



Control



Para interiores

Fácil de usar

Contenido:

50 g.

Sachet 25 g. aprox.



RODENTICIDA

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g. de producto contiene:

BROMADIOLONA 0,005 %p/p

(CAS N° 28772-56-7)

BENZOATO DE DENATONIO 0,001 %p/p

(CAS N° 3734-33-6)

OTROS COMPONENTES C.S.P. 100 g.

GRUPO QUÍMICO: HIDROXICUMARINA

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA

TRATADA: Sin restricción para ingresar al sector tratado. Debe evitarse la entrada de niños, aves y animales, que podrían ingerir accidentalmente el producto.



CLASE IV

POCO PROBABLE PELIGRO EN SU USO NORMAL

Reg. I.S.P. N° P-729/20

VENTA GENERAL

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

