

En caso de intoxicaciones llame a:  
CITUC: (56) 2 2635 3800  
(Atención las 24 horas los 365 días del año).  
BTS Intrade Laboratorios S.A.  
(56) 2 2749 8540 (en horario de oficina).

**Grupo Químico:**  
Derivado cumarínico.

**Condición de venta:** General.

**Fórmula:**  
Cada 100 g de producto contiene:  
Bromadiolona .....0,005%  
(CAS 28772-56-7)  
Benzoato de denatonio (amargante).....0,001%  
Otros componentes c.s.p. .... 100 g

**Registro ISP N° P-618/17**



**VENENO**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS**

**DEADLINE®**  
**SOFT BAIT**  
Cebo Blando 0,005%  
LISTO PARA USAR

CONTENIDO APROX.  
**500 g**  
Cebos Blandos de 10g Aprox.



Producto clase III OMS  
Ligeramente Peligroso

# RATICIDA

# DEADLINE®

**SOFT BAIT**  
Cebo Blando 0,005%  
LISTO PARA USAR



**Deadline Soft Bait** es un eficaz rodenticida anticoagulante de última generación, que mata ratas (ratas y guarenes) y ratones (lauchas). Necesita sólo una dosis para producir la muerte de los roedores a los 4 – 7 días de su ingestión.

**Deadline Soft Bait** es un cebo blando elaborado con cereales de grado alimenticio y un alto porcentaje de aceite, lo que asegura el consumo por parte de los roedores sin importar su especie.

**Deadline Soft Bait** puede ser empleado en interiores y exteriores de viviendas, bodegas, casinos, oficinas, establos y todo tipo de construcciones e incluso permite cebar directamente las madrigueras de los roedores.

**DEADLINE®**  
**SOFT BAIT**  
Cebo Blando 0,005%  
LISTO PARA USAR

Plaga	Dosis
<i>Rattus norvegicus</i> (Guarén o Rata de Alcantarilla)	1 a 2 sachets / 5 a 10 metros lineales
<i>Rattus rattus</i> (Rata de tejado)	
<i>Mus musculus</i> (Ratón o laucha)	1 sachet / 2 a 4 metros lineales

**INDICACIONES DE USO**

Primero asee el lugar y determine posibles áreas de tránsito de roedores. Puede ser aplicado en cualquier época del año. Distribuya los cebos en los lugares más frecuentados por los roedores (bodegas, desagües, entretechos, alcantarillas, botaderos y orillas de cursos de agua). Puede ser aplicado en lugares de alta humedad. Se sugiere la mantención de puntos de cebamiento en lugares estratégicos en forma permanente. Reponer cada 1 a 2 semanas hasta que cese el consumo de **Deadline Soft Bait**. Coloque el cebo en portacebos (tubos de PVC), o estaciones de cebo que imposibiliten el acceso de otros animales (perros, gatos, animales silvestres) y niños.

**TIEMPO DE REINGRESO**

Sin carencia, inmediatamente después de la aplicación.

**PRECAUCIONES PARA PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE**

Evite el contacto con la piel. Use guantes para su aplicación y lávese las manos con agua y jabón después de ésta. No comer, beber ni fumar durante su aplicación. Asegúrese de ubicar el producto en lugares no accesibles a niños y animales domésticos y lejos de alimentos, bebidas y en lugares de preparación de los mismos. Evitar que el producto tome contacto con fuentes de agua. Elimine los cebos no consumidos y destruya los envases vacíos. No almacene junto con alimentos. Este producto es extremadamente tóxico para mamíferos y vida silvestre. Los animales pueden envenenarse al ingerir el cebo o los roedores envenenados.

**PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN**

Mantener alejado de niños, personas irresponsables y animales. Almacenar **Deadline Soft Bait** en envases originales con etiqueta en buen estado, en un lugar seco y bien ventilado. No almacenar junto a alimentos de uso humano y animal.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN**

Puede producir hemorragias variables según la ingesta y retardo del tiempo de coagulación. Se puede observar petequias y equimosis (sangramiento, hemorragias, etc.), letargo, temblores musculares, dolores abdominales y en casos extremos pueden ocurrir convulsiones. Causa irritación ocular moderada.

**PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de ingestión involuntaria no inducir el vómito y acudir al centro asistencial más cercano llevando el envase del producto. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, retire lentes de contacto y lave los ojos con agua tibia por unos minutos, si la molestia persiste, consulte a un médico.

**Antídoto**  
Vitamina K.

Fabricado por:  
Unichem d.o.o.  
Sinja Gorica 2, 1360, Vrhnika,  
Eslovenia.

Importado y distribuido por:  
BTS Intrade Laboratorios S.A.  
Mar del Sur 7358. Pudahuel.  
Santiago de Chile.  
Fono: (56) 2 2749 8540  
www.bts.cl

Producto clase III OMS  
Ligeramente Peligroso