

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: MAXIM® es un producto en base a triclopir. Triclopir pertenece al grupo químico de los ácidos piridincarboxílicos. Mantener el producto siempre en su envase original, en un lugar seco, fresco y bien ventilado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. No almacenar junto con alimentos y/o semillas. Mantener fuera del alcance de los niños y personas no responsables. Para preparación del producto se debe usar delantal impermeable, guantes de goma, botas de goma, mascarilla y antiparras. Durante la aplicación proteja ojos y piel adecuadamente. Se debe usar delantal impermeable, guantes de neopreno o nitrilo, botas de goma, mascarilla y antiparras. No fumar, comer o beber ni exponerse a la niebla de ésta. Lavar toda la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Lavarse prolijamente y cambiarse de ropa después del trabajo. No contaminar aguas de regadío, agua potable, cursos de agua o ríos.

Información Ecotoxicológica: Prácticamente no tóxico para peces. Ligeramente tóxico agudo a las aves. Prácticamente no tóxico en base aguda, para abejas. No tóxico para lombrices.

Síntomas de Intoxicación: Si se ha ingerido en cantidades importantes, pueden existir efectos narcóticos o anestésicos, pueden producirse daños a los riñones y al hígado.

PRIMEROS AUXILIOS: Para todos los casos que se presentan a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de salud a cargo. **Inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si se presenta irritación consulte un médico. **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos luego continúe con el enjuague.

Antídoto: No tiene antídoto conocido. No sería necesario, debido al bajo nivel de toxicidad del producto.

Tratamiento médico de emergencia: Tratamiento sintomático. El tratamiento debe basarse en el criterio del médico, según los síntomas que presente el paciente.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

ALMACENAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.

EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

INUTILIZAR LOS ENVASES Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hr., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA-CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es 2 25604500, Santiago, Chile.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

MAXIM®

FITORREGULADOR TABLETAS SOLUBLES ST

Lote de fabricación :
Fecha Vencimiento :

Autorización
Servicio Agrícola
y Ganadero N° 4.136

MAXIM® es un fitorregulador que mejora el tamaño y calidad de frutos cítricos. En ciertas variedades de naranjos tiene un efecto anticaída, las cuales están indicadas en el cuadro de instrucciones de uso. También es utilizado en limoneros y pomelos para adelantar la cosecha (precocidad) indicados en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICION:

Triclopir*10% p/p (100 g/kg)⁽¹⁾
Coformulantes c.s.p.100% p/p (1 kg)

*Ácido 3,5,6-tricloro-2-piridiloxiacético

⁽¹⁾ Cada tableta contiene 1 gramo de equivalente ácido.

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO
EXPLOSIVO**

CONTENIDO NETO:

Importa y Distribuye:
ARYSTA LIFESCIENCE CHILE S.A.
El Rosal 4610, Huechuraba,
Santiago, Chile.
ET4136-V004
OS1

Fabricado por:
Arysta LifeScience Ougrée Production sprl.,
Rue de Renory, 26/2 – B-4102 Ougrée,
Bélgica.

Fabricado por:
Thompson & Capper Ltd.
Hardwick Road
Astmoor, Runcorn, Cheshire, WA7 1PH
Reino Unido

INSTRUCCIONES DE USO:

MAXIM® es una Auxina, que estimula el crecimiento y maduración de los frutos indicados en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

CULTIVO	OBJETIVOS APLICACIÓN	DOSIS TABLETAS/ha	OBSERVACIONES
Mandarinas Clementinas	Aumento tamaño	20 a 25	Aplicar con un mojamiento de 800 -1.200 litros de agua por hectárea, después de finalizada la caída natural de frutos. El diámetro del 85% de los frutos debe ser superior a 18 mm, equivalente a un diámetro medio entre 20 y 22 mm. Usar la dosis mayor cuando la caída natural de frutos no ha sido la esperada. Dos aplicaciones por temporada.
Limoneros Genova Eureka Lisbon Fino	Precocidad	35 a 40	Aplicar con un mojamiento de 800 -1.200 litros de agua por hectárea. El diámetro del 85% de los frutos debe ser superior a 22 mm, equivalente a un diámetro medio entre 24 y 26 mm. Usar la dosis máxima cuando el diámetro medio supere los 26 mm.
Pomelos Star Ruby	Aumento tamaño, Precocidad, Incremento color	30 a 40	Aplicar con un mojamiento de 800 -1.200 litros de agua por hectárea. El diámetro del 85% de los frutos debe ser superior a 22 mm, equivalente a un diámetro medio entre 24 y 26 mm. Usar la dosis máxima cuando el diámetro medio supere los 26 mm.
Naranjos Valencia Navel	Aumento tamaño	25 a 30	Aplicar con un mojamiento de 800 -1.200 litros de agua por hectárea. Aplicar luego del término de caída natural de frutos y cuando el 80% de los frutos tenga un diámetro superior a 25 mm, equivalente a un diámetro medio entre 26 a 28 mm. Dosis máxima sólo en huertos adultos, con huertos adultos, con mucha carga o en aplicaciones más tardías de lo señalado.
	Efecto anticaída	25	Aplicar con un mojamiento de 800 -1.200 litros de agua por hectárea, inmediatamente antes o durante el cambio de color. Usar la dosis mayor cuando la caída natural de frutos no ha sido la esperada. Dos aplicaciones por temporada.

Preparación de la mezcla: Llene el estanque hasta la mitad, haga una pre mezcla con la cantidad de MAXIM® necesaria y agitando, complete el volumen de agua necesario para la aspersión.

Fitotoxicidad: MAXIM® no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

Incompatibilidad: No se sugieren mezclas de MAXIM® con otros plaguicidas. En cítricos, aplicaciones efectuadas antes del término de la caída natural de frutos, provocarán raleo. No aplicar con temperaturas anormalmente altas o bajas para el período de aplicación, esperar a que se normalicen las condiciones para aplicar. Puede ser fitotóxico para hortalizas y viñedos.

Período de Carencia: 90 días y 60 en el caso de aplicación para evitar caída. Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

Tiempo de Reingreso al Área Tratada: (para personas y animales): Se debe esperar un tiempo de resguardo de 12 horas después de realizada la aplicación.

©MAXIM es marca registrada.



CUIDADO

