

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: La sal potásica de hidrazida maleica pertenece al grupo químico de las Piridazinas.
No fume coma o beba durante el uso de este producto.
Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
Durante la preparación: utilizar guantes impermeables, botas de goma, protector facial, mascarilla para polvos, delantal impermeable y overol impermeable que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
Durante la aplicación: utilizar guantes impermeables, botas de goma, protector facial, mascarilla para polvos, delantal impermeable y overol impermeable que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento.
No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo.
Lavarse prolijamente con agua antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Riesgos ambientales: **ROYAL MH 30** no es tóxico para abejas. No es tóxico para aves. **ROYAL MH 30** es medianamente tóxico para peces; por lo tanto, no contaminar cursos de agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS
REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZAR Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD
NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO O ANIMAL
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

Instrucciones de Triple Lavado:
Paso 1: Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. **Paso 2:** Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y no dejen áreas sin limpiar. **Paso 3:** verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse inutilizar el envase para evitar su reutilización.
Síntomas de Intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.
PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consulte a un Médico.
En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con agua la superficie afectada. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Quitarse y lavar la ropa contaminada. **En caso de irritación** consultar un médico.
En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **En caso de inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Consulte a un Médico.
Antídoto: No se conoce antídoto específico.
Tratamiento Médico de Emergencia: En caso de ingestión puede ser necesario realizar un lavado gástrico: posteriormente puede administrarse una suspensión de carbón activado y un purgante salino. El tratamiento es sintomático y de sostén.
En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA; RITA-CHLE: 2 27771994. El teléfono del importador es: 2 25604500.

NOTA AL COMPRADOR:
Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en la etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido del ingrediente activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

ROYAL MH 30

Fitoregulador
Concentrado Soluble (SL)

Lote N°:
Fecha Venc.: Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 4.124

ROYAL MH 30 es un fitoregulador especialmente indicado para controlar la brotación según lo indicado en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:
Sal potásica de Hidrazida maleica* 24,6 % p/v (246 g/L)
Coformulantes, c.s.p.....100 % p/v (1 L)
*Sal potásica de 6-hidroxi-2*H*-piridazin-3-ona (equivalente a 18,4 % p/v de hidrazida maleica)

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

Contenido Neto:

Fabricado por:
LANXESS Solutions US Inc.
214 Weat Ruby Avenue
NC 28054 -2337- Gastonia
Estados Unidos.

MICRO CHEM
260 Airport Square
Adel, GA 31620
Estados Unidos.

Importado y Distribuido por:
Arysta LifeScience Chile S.A.
El Rosal 4610, Huechuraba
Santiago
ET 4124-V005-XX-OS1

INSTRUCCIONES DE USO:
ROYAL MH 30 es un fitoregulador especialmente indicado para controlar la brotación según lo indicado en el cuadro de instrucciones de uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO			
Cultivo	Objetivo	Dosis (L/ha)	Momento de aplicación
Cebolla	Controlar brotación	12	ROYAL MH 30 debe ser aplicado cuando el bulbo está totalmente maduro, pero todavía la planta presenta por lo menos 5 a 8 hojas verdes (lo que permite la absorción y translocación del producto). Esto ocurre aproximadamente dos semanas antes de la cosecha. Emplear 200 a 300 L de agua/ha . Lluvias caídas hasta 24 horas de la aplicación, pueden disminuir el efecto de ROYAL MH 30
Ajo	Controlar brotación	14	ROYAL MH 30 debe ser aplicado cuando el 50% de las hojas se han volcado pero aún están verdes. Entre 10 a 14 días antes de la cosecha. Usar como mínimo 350 L de solución por ha.
Achicoria industrial	Controlar brotación	12	Realizar 1 aplicación de ROYAL MH 30 , 45 días antes de la cosecha de achicoria, sobre un cultivo con sus hojas sanas y vigorosas, sin agua de rocío o riego en su superficie, para inhibir la emergencia de rebrotes en el cultivo siguiente. Emplear un mojamiento de 300 L de agua/ha.
Papa	Controlar brotación	14	Aplicar 2 semanas después de la floración de las plantas. Mojamiento: 300 L/ha. (*)
Tabaco	Controlar brotación	17 - 28	Aplicar dentro de las 24 horas de haber capado y arrancado los brotes precoces, cuando la floración sea uniforme. Si la floración no es uniforme, recorrer el cultivo y capar las precoces, esperar hasta que el resto de las plantas florezcan, capar y arrancar los brotes de más de 5 cm. Aplicar de 200 a 500 Litros de solución por ha. (**)

(*) Se puede aplicar entre 2 a 4 semanas según variedad y período vegetativo. Ante cualquier duda, pregunte a nuestro departamento Técnico.
(**) Aplicar la dosis menor en tabacos curados a humo y la dosis mayor en tabacos oscuros.
Preparación de la mezcla: se puede adicionar directamente al estanque del equipo pulverizador a medio llenar con agua y completar a volumen total con agitación.
Incompatibilidad: Se recomienda aplicar **ROYAL MH 30** solo, sin otro plaguicida.
Compatibilidades: Es compatible con surfactante no-iónico. En caso de mezclas específicas, consultar a nuestro Departamento Técnico.
Fitotoxicidad: **ROYAL MH 30** no presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados, cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.
Períodos de carencia: Cebolla y Papa: 1 día, debido a que se trata de control de brotación en pre cosecha. Ajo: 7 días. Tabaco y Achicoria industrial: 21 días.
Tiempo de Reingreso para personas y animales: Se puede reingresar al área tratada 2 horas después de la aplicación.
Condiciones determinantes para una aplicación segura y eficaz: Se debe aplicar **ROYAL MH-30** en el momento preciso a fin de controlar los rebrotes en el tabaco. La aplicación temprana podría impedir el desarrollo de las hojas superiores de manera normal. Aplicar después de la época adecuada, el control no será suficiente. Debe aplicarse en plena floración, o sea cuando 90% de las plantas empezaron a perder sus primeras flores. No aplicar si se esperan lluvias dentro de las 6 horas siguientes de la aplicación, ésta puede disminuir su eficacia y recomendamos repetirla. La aplicación debe hacerse de manera uniforme, utilizando la dosis recomendada. Se obtendrán mejores resultados haciendo la aplicación en las mañanas; deben evitarse las aplicaciones en la tarde o por la noche.



CUIDADO

