Grupo químico: ingrediente activo atrazina pertenece al grupo químico de las 1,3,5-triazinas.

Precauciones y Advertencias:

- **durante su manejo**: vestir ropa de protección (durante la preparación de la mezcla usar guantes impermeables, protector facial, botas de goma y delantal impermeable y durante la aplicación usar guantes impermeables, protector facial, botas de goma y overol impermeable). Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No respirar el polvo del producto ni neblina de pulverización. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse inmediatamente cualquier salpicadura. Si ocurre algún problema, detener el trabajo, aplicar las medidas de primeros auxilios y llamar a un médico de inmediato. No contaminar aguas, alimentos o forraje. Alejar a los animales. No recolectar alimentos o forraje del área recién tratada.
- **después de su manejo:** lavarse las manos y cara con agua y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño; lavarse muy bien todo el cuerpo antes de dejar el lugar de trabajo. Lavar aparte la ropa y el equipo usados.

Una vez vacíos los envases, inutilizarlos (cortándolos o perforándolos) y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes, lejos de áreas de pastoreo, viviendas y aguas. No dañar la etiqueta durante todo este proceso. Eliminar los desechos de pulverización en tierras sin cultivar.

Almacenar bajo llave, en los envases originales cerrados y con la etiqueta correspondiente, a la sombra, en un lugar seco y bien ventilado, aparte de alimentos y forraje. Evitar almacenar a temperaturas sobre 35°C.

Síntomas de intoxicación: no específicos.

Primeros auxilios: en caso de sospechar una intoxicación, detener el trabajo y llamar inmediatamente a un médico. Mientras tanto, alejar al afectado de la zona de peligro y aplicar las medidas de primeros auxilios. En caso de: **Inhalación**: llevar al paciente a un área ventilada. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, administre respiración artificial y acuda inmediatamente al médico llevando la etiqueta; **Contacto con la piel o ropa:** retirar la ropa contaminada y lavar bien las partes del cuerpo afectadas con abundante agua limpia, lave la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Si las molestias persisten, consultar a un médico; **Contacto con los ojos:** lavarlos con los párpados bien separados y levantados con abundante agua limpia durante 15 minutos, cuando el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua limpia por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar 15 minutos. En ambos casos consultar a un médico o CITUC; **Ingestión:** buscar inmediatamente asistencia médica y llevar la etiqueta del producto. No inducir el vómito. Nunca dar nada por vía oral a un paciente inconsciente y mantenerlo acostado de lado. Mantener al paciente abrigado y en reposo.

Antídoto: No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Tratamiento médico de emergencia: ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica. Considerar el lavado gástrico, protegiendo la vía aérea, si existe la posibilidad de una toxicidad severa. El máximo beneficio de la descontaminación gastrointestinal se espera dentro de la primera hora de ingestión.

Información para el medio ambiente: tóxico para la pulga acuática, lombrices de tierra y peces y muy tóxico para las algas. Prácticamente no tóxico para abejas y aves.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS"
"ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEER LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD"
"EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD"
"INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES, DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES"
"MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO"
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL"
"TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO Y ASEGURAR LA CARGA, DE MODO DE EVITAR CAIDAS O DERRAMES"
"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"
"NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO EN LA ETIQUETA"
"LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE"

Convenio CITUC/AFIPA - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana:
En caso de INTOXICACION llamar al ☎: 22635 3800
En caso de EMERGENCIAS QUÍMICAS, DERRAME o INCENDIO, llamar al ☎: 22-247 3600
Consultas a Syngenta S.A.: 22 - 941 0100 - Horario de oficina - Santiago - Chile.

21.12.2020

GESAPRIM ® 90 WG

HERBICIDA - Granulado Dispersable (WG)

Composición

Atrazina *	90 % p/p (900 g/kg)
Coformulantes, c.s.p.	100 % p/p (1 kg)

* 6-cloro-*N*²-etil-*N*⁴-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina

NO INFLAMABLE-NO CORROSIVO-NO EXPLOSIVO

GESAPRIM® 90 WG es un herbicida selectivo para el control de malezas anuales de hoja ancha en maíz, sorgo y forestales (pino y eucalipto) (ver cuadro de instrucciones de uso). Es un herbicida suelo activo, que es absorbido principalmente por raíces y hojas, provocando una inhibición en la fotosíntesis de las malezas. **GESAPRIM® 90 WG** presenta una baja solubilidad en agua, lo cual le permite permanecer activo por 3 a 5 meses en la capa superficial del suelo.

Su formulación es altamente concentrada, lo que soluciona problemas de transporte, almacenamiento y manejo en el campo. Al verterse el producto al estanque, no levanta polvo, lo que disminuye los riesgos para el usuario. Adicionalmente, los envases se vacían completamente, permitiendo el uso total del producto, sin dejar residuos.

Contenido Neto del Envase:

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3088
Fabricado por:
Syngenta Crop Protection AG., Werk Rosental
Schwarzwaldallee 215, CH-4058, Basilea, Suiza.
Syngenta Crop Protection, Inc., 3905 Highway 75, St. Gabriel, LA 70776, Estados Unidos
Importado y Distribuido por: Syngenta S.A.
Isidora Goyenechea 2800 of. 3701, – Las Condes
Santiago – Chile.

Lote de fabricación:
Fecha de vencimiento:
®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

INSTRUCCIONES DE USO:

GESAPRIM® 90 WG es un herbicida selectivo para el control de malezas anuales de hoja ancha. Aplicar de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

Cuadro de Instrucciones de Uso

Cultivos	Malezas	Dosis (kg/ha)	Observaciones
Maíz, Sorgo	Bolsita del pastor (*Capsella bursa-pastoris*), Chamico (*Datura stramonium*), Quilloi-Quilloi (*Stellaria media*), Quinguilla (*Chenopodium* spp.), Rábano (*Raphanus raphanistrum*), Verdolaga (*Portulaca oleracea*) Yuyo (*Brassica rapa*) y Ortiga (*Urtica urens*)	1,6	Puede aplicarse una sola vez por temporada, ya sea de pre-siembra, incorporándolo con un rastraje superficial, de pre-emergencia o de post-emergencia temprana, con malezas de 2 a 4 hojas. Usar volúmenes de agua de 150 a 300 L/ha. Debe aplicarse con humedad en el suelo.
Forestales (Pino y Eucalipto)		1,7-3,0	Aplicación una sola vez en la temporada, en pre-plantación. En eucalipto no debe utilizarse en suelos arenosos y con baja materia orgánica por el riesgo de lixiviación del producto a la zona donde se ubican las raíces. Usar volúmenes de agua de 100 a 150 L/ha. Debe aplicarse con humedad en el suelo. Aplicar la dosis mayor cuando se espere una infestación media alta. La dosis menor deberá ser usada en condiciones de menor infestación.

GESAPRIM® 90 WG puede utilizarse con cualquier equipo de aplicación de herbicidas.

Consideraciones especiales:

- Al efectuar la aplicación, se debe cuidar de no traslapar o superponer las pasadas para evitar sobredosificaciones.
- La experiencia práctica indica que es posible el desarrollo de biotipos de malezas resistentes a atrazina, como chamico y quingüilla, por lo cual, para obtener un adecuado control puede ser necesaria su mezcla con herbicidas de diferente modo de acción o su complemento con herbicidas de post-emergencia.

Método de preparar la mezcla: llenar el estanque con agua limpia hasta más de la mitad de su capacidad. Poner en funcionamiento el sistema de retorno y/o agitadores mecánicos. Cortar las bolsas en uno de sus ángulos. Agregar la cantidad necesaria de **GESAPRIM® 90 WG** al estanque de la pulverizadora. Finalmente, completar con agua el estanque, manteniendo constantemente en funcionamiento el retorno y/o agitador hasta el final de la aplicación.

Manejo y grupo de Resistencia: **Atrazina** | **HRAC** | **5**

Compatibilidad: GESAPRIM® 90 WG es compatible con **TOUCHDOWN® IQ**, **CALLISTO® 480 SC**, **GRAMOXONE® SUPER** y **FARMON®** y también puede ser aplicado junto con insecticidas de suelo, para el control de insectos en tratamientos de pre-siembra.

Incompatibilidad: no se tienen reportes. Como es imposible conocer la compatibilidad de **GESAPRIM® 90 WG** con todos los productos del mercado, Syngenta S.A. no asume responsabilidades por mezclas hechas con otros productos que no sean mencionados específicamente en esta etiqueta. En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación.

Fitotoxicidad: en caso de pérdida de la siembra del cultivo de maíz o sorgo aplicado con **GESAPRIM® 90 WG** solo podrán resembrarse estos cultivos de manera inmediata. No sembrar o cultivar remolacha, tabaco, hortalizas (incluyendo leguminosas), soya ni praderas hasta a lo menos un año después de la aplicación.

Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan problemas de fitotoxicidad.

Período de carencia: por corresponde por la naturaleza de la aplicación.

Tiempo de reingreso: no ingresar al área tratada antes de 3 horas de realizada la aplicación o hasta que esté completamente seca, a menos que se vista ropa de protección. Para maíz y sorgo no corresponde indicar período de reingreso para animales, por el momento de aplicación. Para los otros cultivos, no corresponde indicar período de reingreso para animales, por el momento de aplicación y porque su objetivo productivo no es la alimentación animal.

Importante: La información contenida en esta etiqueta representa el más reciente conocimiento de Syngenta en las materias informadas. No obstante, Syngenta garantiza exclusivamente la calidad del Producto y de su contenido activo, mientras esté bajo su control directo. Las instrucciones de conservación y uso describen, conforme a las pruebas realizadas, la forma apropiada de operar el Producto para obtener los resultados esperados. Sin embargo, dichas instrucciones no constituyen garantía explícita ni implícita, debido a la existencia de circunstancias externas en un medio biológico cambiante, que se encuentran fuera del control de Syngenta. Todos nuestros productos han sido debidamente probados; a pesar de ello, no es posible testear todos los usos, formas o métodos de aplicación, medios agroclimáticos, suelos, fechas de aplicación y sistemas de cultivo a los que el Usuario pueda eventualmente someter al Producto, por los que Syngenta no se hace responsable. Ante cualquier duda, consulte con su asesor técnico de Syngenta. Asimismo, una vez que el Producto sale del control directo de Syngenta, cumpliendo las características anteriormente señaladas, el Usuario asume todos los riesgos asociados al uso, momento y manejo del Producto, aun siguiendo las instrucciones contenidas en esta etiqueta, como asimismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en las jurisdicciones relevantes. La información de la presente etiqueta sobre naturaleza y uso del Producto anula cualquier otra, ya sea escrita u oral.

CUIDADO

PROPIEDAD DE SYNGENTA
USO EXCLUSIVO OFICIAL SAG