FOSFIMAX

Zn

Fertilizante inorgánico Líquido de aplicación Foliar y Radicular
Fósforo de Zinc de rápida asimilación

COMPOSICIÓN	% p/p	% p/v
Fósforo (P_2O_5)	20,0	24,2
Zinc	5,0	6,05
Densidad a 20°C: 1210 g/L pH: 2 Solubilidad en agua a 20°C: 100%		
Contenido en metales pesados: Arsénico (As) < 10 mg/Kg; Cadmio (Cd) < 0,5 mg/Kg; Cromo Hexavalente (CrVI) < 0,5 mg/Kg; Mercurio (Hg) < 0,5 mg/Kg; Niquel (Ni) < 50 mg/Kg; Plomo (Pb) < 5 mg/Kg; Cobre (Cu) < 600 mg/kg		

IMPORTADO POR:

BIOAMERICA

BIOAMERICA, S.A.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6
Lote B-2 Paine, Santiago– Chile.
Fono: (56 2)2350 7400
info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

FABRICADO POR:

FUTURECO BIOSCIENCE

FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.
Av. del Cadí, 19-23,
P.I. Sant Pere de Molanta
08799 Olèrdola. Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
info@futurecobioscience.com

CONTENIDO

5 L

Origen: España

FÓSFORO DE ZINC DE RÁPIDA ASIMILACIÓN

FOSFIMAX
Zn

CARACTERÍSTICAS

FOSFIMAX Zn es un producto desarrollado para la prevención y corrección de carencias de Zinc, favorece el desarrollo radicular y estimula los procesos de floración, cuajado y maduración de los frutos. FOSFIMAX Zn tiene acción sistémica, se absorbe rápidamente y se distribuye a todas las partes de la planta.

CULTIVO	CONCENTRACIÓN cc/100L	OBSERVACIONES
Vides y Kiwis	100-150	Aplicar en pre-floración y repetir 3-4 aplicaciones a lo largo del cultivo, a intervalos de 15-20 días.
Pomáceas	100-150	Aplicar en pre-floración, cuajado y desarrollo de frutos.
Durazneros, Nectarinos, Almendros, Ciruelos y Cerezos	100-150	Aplicar en post-cosecha y 20 días después.
Nogales y Avellanos	50	Aplicar desde febrero cada 20 días.
Paltos y Cítricos	100-150	Aplicar a fines del verano y repetir cada 15-20 días.
Berries (Arándanos, Frambuesos, Frutillas)	100-150	Aplicar en post-cosecha y 20 días después.
Hortalizas	100-150	Repartir un mínimo de 3-4 aplicaciones cada 15-20 días a lo largo del cultivo.
Industriales	100-150	Repartir un mínimo de 3-4 aplicaciones a lo largo del cultivo.
Cereales	300	Repartir un mínimo de 4 aplicaciones cada 15-20 días a lo largo del cultivo.

COMPATIBILIDAD:

FOSFIMAX Zn es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas, excepto con dicofol, dimetoato, aceites y productos cúpricos. Para aplicación con fitosanitarios, observar las recomendaciones de mezcla del fabricante, y si es posible hacer una prueba de compatibilidad en un volumen pequeño.

PRECAUCIONES:

Mantener en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos.

ADVERTENCIAS:

Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

Nº LOTE:

FECHA DE FABRICACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: