Helvetica Neue Condensed - Cuerpo 8

Helvetica Neue Condensed 24, 10, 8

27,5 cm.

Helvetica Neue Condensed - Cuerpo 7

13,5 cm.

2,0 cm.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Miclobutanilo pertenece al grupo químico de los Triazoles.

No comer, beber ni fumar durante su aplicación y manipulación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Equipo de protección personal durante la manipulación, usar protector facial, delantal impermeable, botas de goma y guantes impermeables. Equipo de protección personal durante la aplicación, usar traje impermeable, botas de goma, guantes impermeables y protector facial. No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua. No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos. Conservar el producto en una bodega con llave, seca, fresca y ventilada, lejos de fuentes de calor, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes.

Información Ecotoxicológica: LINUS® es moderadamente tóxico a peces, ligeramente tóxico a aves y virtualmente no tóxico a abejas.

Instrucciones para triple lavado: Realizar Triple lavado de los envases, agregando agua al recipiente hasta un cuarto de su volumen, agitar bien y verter en la máquina pulverizadora, lo cual se debe repetir tres veces. Luego, disponer los envases en algún lugar destinado sólo para acopio de estos, dentro del predio. Posteriormente, enviar envases a un centro de acopio y chipiado de envases vacíos, dispuesto por la autoridad local.

Síntomas de Intoxicación: Náuseas, vómitos, diarrea e irritación de las mucosas, cefalea, dolor abdominal.

Antídoto: Sin antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: **Inhalación**: Trasladar al afectado al aire fresco. Si la persona no respira dar respiración artificial utilizando una máscara plástica para protegerse de envenenamiento. Mantenga al afectado temperado y en reposo. **Contacto con la piel**: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. **Contacto con los ojos**: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **Ingestión**: No inducir vómito. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Mantener al afectado en posición de descanso y abrigado. Solamente si el afectado esta consciente, lavar la boca con abundante agua limpia.

En todos los casos, trasladar al afectado inmediatamente a un Centro Asistencial. Lleve la Etiqueta o el Envase.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

NO TRANSPORTAR NI ALMACENER CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

En caso de INTOXICACIÓN llamar: Centro de Información Toxicológica UC (CITUC) : 56 2 2635 3800 (24 horas) Arysta Lifescience /UPL: 56 2 2560 4500 - 56 2 2560 4530

LINUS®

FUNGICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

N° de Lote:

Fecha Vencimiento:

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2715

LINUS® es un fungicida sistémico, preventivo y curativo, recomendado para el control de enfermedades foliares, de los cultivos citados en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo	**% p/v**
Miclobutanilo*	24% p/v (240 g/l)
Coformulantes c.s.p.	100% p/v(1l)

*(*RS*) 2-(*p*-clorofenil)-2-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ilmetil) hexanonitrilo

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

Contenido Neto: 1 L

Formulado por:
Agrospec S.A.
Camino El Milagro 257
Maipú - Santiago, Chile
Telefono: 56 2 2836 8000
agrospec.cl

Distribuido por:

Arysta LifeScience Chile S.A. una empresa UPL
El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago
Tel: 56 2 2560 4500 - 2560 4501
https://www.upl-ltd.com/cl
ET2715-V002

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción: LINUS® es un fungicida sistémico, con acción preventiva y curativa.

Equipo de aplicación: pulverizador, avión o helicóptero.

Preparación de la mezcla: para cada una de las aplicaciones, realizar la dilución en agua, agregando **LINUS®** al estanque de aplicación a medio llenar, con el agitador en funcionamiento, para luego completar con agua el estanque y aplicar.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO TERRESTRE:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (*)	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Vides	Oídio (*Uncinula necator*)	10– 12 cc/100 L de agua	Iniciar las aplicaciones con brote de 5 a 10 cm de largo. Repetir cada 10-12 días. Aplicaciones por temporada: máximo 4, rotando con productos de distinto grupo químico. Mojamiento sugerido: Considerar un mojamiento de entre 500-2.000 L /ha, dependiendo de la forma de conducción y la cantidad de follaje presente al momento de la aplicación.	10
Olivo	Repilo (*Fusicladium oleagineum*)	12 cc/100 L de agua	Iniciar las aplicaciones desde post-cosecha y hasta antes de floración, al observar condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Número máximo de aplicaciones por temporada: 2. Aplicar con buen cubrimiento acorde al desarrollo vegetativo del cultivo. Mojamiento recomendado: 1.500 – 2.500 L/ha.	70
Tomate Pimiento	Oídio (*Oidium lycorpersici, Leveillula taurina*)	120– 200 cc/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos, aumentar las dosis de aplicación a medida que crece el cultivo. Mojamiento sugerido: 200 - 300 L /ha. N° aplicaciones por temporada: 2.	Tomate: 10 Pimiento: 3
Remolacha azucarera	Oídio (*Erysiphe polygoni*)	200– 250 cc/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros síntomas. Repetir cada 15 a 20 días. Mojamiento: 200 - 300 L /ha. N° aplicaciones por temporada: 2.	28
Papa	Oídio (*Golovinomyces cichoracearum*)	200– 250 cc/ha	Aplicar preventivamente desde el momento en que se observen los primeros signos de Oídio. Repetir cada 15 a 20 días. Mojamiento sugerido: 200 - 300 L /ha. N° aplicaciones por temporada: 3.	3
Arroz, Avena, Cebada, Centeno, Trigo	Oídio (*Blumeria graminis*)	200– 250 cc/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros síntomas. Repetir cada 15 a 20 días. Mojamiento sugerido: 200 - 400 L /ha. N° aplicaciones por temporada: 2.	20
Melón, Sandía, Zapallo, Pepino, Zapallo Italiano	Oídio (*Golovinomyces cichoracearum*)	130– 170 cc/ha	Aplicar preventivamente o al aparecer los primeros síntomas. Repetir cada 15 a 20 días. Mojamiento sugerido 500 L /ha. N° aplicaciones por temporada: 2.	3

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO AÉREO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (*)	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
Olivo	Repilo (*Fusicladium oleagineum*)	240– 300 cc/ha	Iniciar las aplicaciones desde post-cosecha y hasta antes de floración, al observar condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Número máximo de aplicaciones por temporada: 2 Mojamiento recomendado: 60 L/ha.	70

(*) Aplicar la dosis menor en caso de menor presión de la enfermedad y la dosis mayor en caso de mayor presión de la enfermedad.

Precauciones: Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento excesivo (más de 8 km/hr), no aplicar con T° mayores a 25°C o alta humedad ambiental.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que se indican.

Compatibilidad: Compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. Si se utiliza en mezcla con otros plaguicidas se recomienda realizar prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de cada aplicación.

Incompatibilidad: No aplicar con productos de reacción alcalina o ácida. No mezclar con Caldo Bordolés y Polisulfuro de calcio.

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas después de ser aplicado; para animales no corresponde, por que el objetivo productivo de los cultivos no es la alimentación animal.

Nota del fabricante: El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, según las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

® Es marca registrada de Arysta Lifescience Chile S.A.



CUIDADO



PANTONE 293 C

LIBELTON