

TRINICA® CS

INSECTICIDA

El poder **microencapsulado y más concentrado.**

- Buena acción de volteo.
- Formulación capsula en suspensión (CS).
- 5 veces más concentrado que otras lambda-cihalotrinas del mercado.
- Alta permanencia y eficacia.
- Etiqueta para el control de *Drosophila suzukii.*

UPL

TRINICA® CS
INSECTICIDA

UPL

¿Qué es TRINICA®?

TRINICA® CS, es un piretroide sintético con actividad insecticida de contacto e ingestión, no sistémico, con efecto de repelencia y anti-alimentario. Posee buen efecto de volteo que actúa sobre los insectos.



TRINICA® CS presenta tecnología de **microencapsulación**, que encierra el ingrediente activo líquido en una cubierta de polímero para brindar protección contra condiciones ambientales hostiles.

Composición:

Lambda-cihalotrina.....25% p/v (250g/L)

Coformulantes c.s.p. ..... 100% p/v (1L)


N° Registro SAG: 1930
Formulación: Cápsula de suspensión (CS)
Banda Toxicológica: Amarilla

Julio 2025 V 001



Modo de acción

TRINICA® CS pertenece al **grupo IRAC 3 A** (modulador del canal de sodio), este penetra la cutícula del insecto, a través de los canales de sodio e interrumpe la conducción nerviosa en cuestión de minutos, esto conduce al cese de la alimentación, pérdida del control muscular, parálisis y finalmente la muerte.



Fuente: https://irac-online.org/documents/moa-structures-poster-spanish/

TRINICA® CS
INSECTICIDA

UPL

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO			
CULTIVO	**PLAGA**	**DOSIS**	**OBSERVACIONES**
Cerezas, Ciruelas, Nectarines, Pluots y Plumcots	Mosca de alas manchadas *(Drosophila suzukii)*	2 - 4 cc/hL ó 30 - 80 cc/ha	Aplicar de acuerdo con monitoreo de la plaga, desde estado fenológico de pinta a cosecha. N°máximo de aplicaciones por temporada: 4 con una frecuencia de 7 días entre aplicaciones. Resguardar los períodos de carencia indicados en la etiqueta*
Manzanos, Perales, Membrilleros	Polilla de la manzana *(Cydia pomonella)*	3 - 6 cc/100 L (Mínimo 40 cc/ha)	Aplicar de acuerdo con monitoreo de la plaga. Utilizar la dosis menor para períodos de protección más cortos donde hay un activo crecimiento de frutos y brotes; y la mayor para conseguir un período de protección más prolongado cuando está totalmente desarrollado el fruto. Aplicar hasta 3 veces por temporada utilizando intervalos entre 7 y 21 días. Resguardar los períodos de carencia indicados en la etiqueta. Para volúmenes mayores respetar la dosis por concentración (cc/hL)
Nogales	Polilla de la manzana *(Cydia pomonella)*	4 - 6 cc/100 L (Mínimo 80 cc/ha)	
Durazneros, Cerezos, Ciruelos, Damascos, Nectarines, Pluot y Plumcot	Polilla oriental *(Cydia molesta)*	2 - 4 cc/100 L (Mínimo 30 cc/ha)	Aplicar de acuerdo con monitoreo de la plaga. Utilizar la dosis menor para períodos de protección más cortos donde hay un activo crecimiento de frutos y brotes; y la mayor para conseguir un período de protección más prolongado cuando está totalmente desarrollado el fruto. Aplicar hasta 3 veces por temporada utilizando intervalos entre 7 y 21 días. Resguardar los períodos de carencia indicados en la etiqueta. Para volúmenes mayores respetar la dosis por concentración (cc/hL).
Tomates	Polilla del tomate *(Tuta absoluta)*	50 cc/ha	Aplicar de acuerdo con monitoreo de foliolos dañados y monitoreo de la plaga, de estados adultos, larvas. N° máximo de aplicaciones por temporada: 4 con una frecuencia de 7 días entre aplicaciones.
Praderas	Cuncunilla negra de las empastadas *(Dalaca pallens)*	30 - 40 cc/ha	Utilizar en praderas de baja altura o después de corte. Aplicar mientras exista presión de la plaga hasta 4 veces por temporada con intervalo de 10 a 30 días. Aplicar dosis mayor con alta presión de la plaga.

*NOTA: La dosis a usar (mayor o menor) dependerá del grado o condiciones de presión imperantes al momento de su aplicación.

UPL

pronutiva®

Crop Protection + BioSolutions

Programa exclusivo de UPL, que integra biosoluciones naturales
(bioprotección + bioestimulantes + bionutrición),
con productos convencionales de protección de cultivos
para satisfacer o superar las necesidades del mundo real
de la agricultura de hoy.

AFIPA CHILE

SEGURIDAD SEGURIDAD AMBIENTE TRIPLE LAVADO

Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
® Marca Registrada.

En caso de INTOXICACION: Llamar al fono: (2) 2635 3800 Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile o a RITA/CHILE a los fonos: (2) 2777 1994.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí estén expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere. ® Marcas Registradas.

CASA MATRIZ: El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago - Fono: 22560 4500 / www.upl.cl