UPL
OpenAg™

pronutiva®
Crop Protection + BioSolutions

Programa exclusivo de UPL, que integra biosoluciones naturales
(bioprotección + bioestimulantes + bionutrición),
con productos convencionales de protección de cultivos
para satisfacer o superar las necesidades del mundo real
de la agricultura de hoy.

Afipa®
Empresa Asociada

TRIPLE LAVADO

Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
® Marca Registrada.

En caso de INTOXICACION: Llamar al fono: (2) 2635 3800 Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile o a RITA/CHILE a los fonos: (2) 2777 1994.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí estén expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere. ® Marcas Registradas.

CASA MATRIZ: El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago - Fono: 22560 4500 / www.upl-ltd.com/.cl



Prepara tu cultivo para obtener los mejores resultados, desde ahora....
Te sorprenderás

- Fungicida sistémico con acción preventiva y curativa.
- Rapidez de penetración y gran acción sistémica.
- Gran eficacia y persistencia.
- Respetuoso con la fauna útil y el medio ambiente.
- Totalmente selectivo para el cultivo.

UPL
OpenAg™

LINUS® 240 EC
FUNGICIDA

¿Qué es Linus®?

Linus®, es un fungicida sistémico, con acción preventiva y curativa. Pertenece al grupo químico de los triazoles, cuya materia activa es miclobutanil. Linus®, está registrado en gran número de cultivos, en los que resulta altamente selectivo a las dosis de uso. En especial, en vides, contra oídio.



¿Cómo actúa Linus®?

Linus®, actúa inhibiendo la biosíntesis de ergosterol del hongo. Tiene dos modos de acción:

Preventivo: Linus®, impide la germinación de las esporas y por tanto, la infección del hongo en la planta.

Curativo: Cuando el hongo ya está establecido en la planta y en período de incubación, Linus®, detiene el desarrollo del micelio, impidiendo nuevas reinfecciones.

Linus®, destaca por su extraordinaria sistemia, gracias a su alta liposolubilidad e hidrosolubilidad, el compuesto se trasloca rápidamente por la savia de la planta en sentido acropétalo, a través del xilema, siendo capaz de alcanzar rápidamente hojas y yemas de nuevo desarrollo. Esta característica le permite proteger los órganos en formación durante la etapa de crecimiento activo del cultivo y actuar no sólo de manera preventiva, sino de forma curativa, deteniendo el crecimiento interno del micelio del hongo en las primeras fases de la infección, cuando los síntomas aún no son visibles.

Composición:

Miclobutanil* ..... 24% p/v (240 g/L)
Coformulantes, c.s.p. ..... 100% p/v (1 L)
* (RS)-2-p-clorofenil-2-(1H – 1,2,4-triazol-1-ilmetil) hexanonitrilo.



Características de su eficacia:

Rapidez de penetración y gran acción sistémica: Linus®, penetra rápidamente en el interior de la planta (en aproximadamente 1 hora) y se transloca a todas las partes verdes de la misma, quedando protegido del lavado por las lluvias posteriores a la aplicación.


Gran eficacia y persistencia: Linus®, es siempre eficaz contra todas las especies de oídio y con una gran persistencia de acción que protege los brotes de nuevo desarrollo.

Total selectividad: Linus®, es totalmente selectivo para el cultivo a cualquier temperatura ambiental, a las dosis recomendadas.

Respetuoso con la fauna y el medio ambiente: Linus®, no presenta efectos adversos sobre la fauna benéfica. Está recomendado en los programas integrados de plagas.

Momento de aplicación de Linus®, para el control de Oídio

Estados fenológicos de la vid.



UPL OpenAg™

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO TERRESTRE

Cultivos	Enfermedades	Dosis*	Observaciones	Carencias (días)
Vides	Oídio *Uncinula necator*	10 - 12 cc/100 L de agua	Iniciar las aplicaciones con brote de 5 a 10 cm de largo. Repetir cada 10 - 12 días. Aplicaciones por temporada: máximo 4, rotando con productos de distinto grupo químico. Mojamiento: Considerar un mojamiento de entre 500 - 2.000 L de agua/ha, dependiendo de la forma de conducción y la cantidad de follaje presente al momento de la aplicación.	10
Olivo	Repilo *Fusicladium oleagineum*	12 cc/100 L de agua	Iniciarlas aplicaciones desde post-cosecha y hasta antes de floración, al observar condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Número máximo de aplicaciones por temporada: 2. Aplicar con buen cubrimiento acorde al desarrollo vegetativo del cultivo. Mojamiento recomendado: 1.500 - 2.500 L/ha.	70
Tomate Pimiento	Oídio *Oidium lycorpersici* *Leveillula taurina*	120 - 200 cc/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos, aumentar las dosis de aplicación a medida que crece el cultivo. Mojamiento: 200 - 300 L/ha. Nº aplicaciones por temporada: 2.	Tomate: 10 Pimiento: 3
Remolacha azucarera	Oídio *Erysiphe polygoni*	200 - 250 cc/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros síntomas. Repetir cada 15 a 20 días. Mojamiento: 200 - 300 L/ha. Nº aplicaciones por temporada: 2.	28
Papa	Oídio *Golovinomyces cichoracearum*	200 - 250 cc/ha	Aplicar preventivamente desde el momento en que se ven los primeros signos de oídio. Repetir cada 15 a 20 días. Mojamiento: 200 - 300 L/ha. Nº aplicaciones por temporada: 3.	3
Arroz Avena Cebada Centeno Trigo	Oídio *Blumeria gramlnis*	200 - 250 cc/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros síntomas. Repetir cada 15 a 20 días. Mojamiento: 200 - 400 L/ha. Nº de aplicaciones por temporada: 2.	20
Melón Sandía Zapallo Pepino zapallo italiano	Oídio *Golovinomyces cichoracearum*	130 - 170 cc/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas. Repetir cada 15 a 20 días. Mojamiento: 500 L/ha. Nº aplicaciones por temporada: 2.	3

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO AÉREO

Cultivos	Enfermedades	Dosis*	Observaciones	Carencias (días)
Olivo	Repilo *Fusicladium oleagineum*	240 - 300 cc/ha	Iniciar las aplicacionesdesdepost-cosechay hasta antes de floración, al observar condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Número máximo de aplicacionespor temporada: 2. Majamiento recomendado: 60 L/ha.	70

*Aplicar la dosis menor en caso de menor presión de la enfermedad y la dosis mayor en caso de mayor presión de la enfermedad.



Noviembre 2022 V 002