UPL
OpenAg™

pronutiva®
Crop Protection + BioSolutions

Programa exclusivo de UPL, que integra biosoluciones naturales
(bioprotección + bioestimulantes + bionutrición),
con productos convencionales de protección de cultivos
para satisfacer o superar las necesidades del mundo real
de la agricultura de hoy.

Afipa®
Empresa Asociada


ENVASE RETORNABLE
TRIPLE LAVADO

Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
® Marca Registrada.

En caso de INTOXICACION: Llamar al fono: (2) 2635 3800 Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile o a RITA/CHILE a los fonos: (2) 2777 1994.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí estén expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere. ® Marcas Registradas.

CASA MATRIZ: El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago - Fono: 22560 4500 / www.upl-ltd.com/.cl



Efectivo control en *Rhizoctonia solani* y Tizón temprano

- Posee acción sistémica y translaminar.
- Prolongado período de protección.
- Mayor rendimiento y calidad.

UPL
OpenAg™

AZOXYSTROBIN® 250 SC
FUNGICIDA



¿Qué es Azoxystrobin 250 SC?

Azoxystrobin® 250 SC, es un funguicida sistémico y de contacto, con acción preventiva, curativa y antiesporulante apropiado para el control de enfermedades fúngicas en una amplia gama de cultivos.

¿Cómo actúa Azoxystrobin® 250 SC?

Azoxystrobin® 250 SC, inhibe el proceso de respiración mitocondrial de las células de los hongos, al impedir la transferencia de electrones entre el citocromo b y el c1, evitando así la formación de energía (ATP) necesario para su crecimiento y desarrollo, es un potente inhibidor de la germinación de esporas y crecimiento del micelio. Pertenece al grupo químico de las estrobirulinas y se presenta en forma de suspensión concentrada.

Composición:

Azoxistrobina* ..... 25% p/v (250 g/L)
Coformulantes, c.s.p. ..... 100% p/v (1 L)

* (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato de metilo



Mejor asimilación de Nitrógeno

Azoxystrobin® 250 SC, actúa sobre el metabolismo del Nitrógeno (N), provocando un "efecto verde" sobre las plantas. Asimismo, inhibe la secreción de etileno, permitiendo extender el período de actividad fotosintética por mayor tiempo. Azoxystrobin® 250 SC, no solo ayuda a un cultivo más sano sino que su uso estimula a un mayor rendimiento y mejor calidad.

Ventajas de Azoxystrobin® 250 SC:

- Su larga residualidad, asegura una buena protección de las hojas, retardando la senescencia con efecto positivo en al rendimiento.
- Tiene actividad translaminar (sistemía localizada) lo que significa una eficacia frente a cultivos con follajes densos.
- Asegura un buen establecimiento y contribuye a un mayor rendimiento y mejor calidad del cultivo.

Compatibilidad:

Azoxystrobin® 250 SC, es altamente compatible con productos fitosanitarios de uso común. No es compatible con insecticidas organofosforados





CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO APLICACIONES TERRESTRES

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Vid de mesa, vinífera y pisquera	Oídio *(Uncinula necator)* Pudrición Ácida (Complejo de Hongos) *(Aspergillus niger Cladosporium sp. Penicillium expansum, Rhizopus stolonifer)*	40 - 75 cc/100 L de agua
Vid de mesa, vinífera y pisquera	Mildiu *(Plasmoparaviticola)*	40 - 75 cc/100 L de agua
Almendro, cerezo, damasco, duraznero y nectarino	Oidio *(Sphaerothecapannosa)* Roya *(Tranzscheliadiscolor)*	50 - 75 cc/100 L de agua
Arándano, frambuesa, frutilla y mora	Oidio *(Sphaerotheca macularis),* Antracnosis *(Cercosporasp. Colletotrichum gloesporoides),* Botritis *(Botrytis cinerea)*	75 - 100 cc/100 L de agua
Trigo, cebada, avena y triticale	Royas o polvillos *(Puccinia striiformis, Puccinia recondita, Puccinia graminis),* Helmintosporiosis *(Helminthosporium gramineum),* Septoriosis *(Septoria tritici, Septoria nodorum),* Oidio *(Erysiphegraminis)*	0,5 L/ha
Papa	Tizón temprano *(Alternaria solani)*	0,5 L/ha
	Cancrosis del tallo *(Rhizoctoniasolani)*	3,0 L/ha
Remolacha	Pudricionde la raíz *(Rhizoctoniasolani)*	1,0 - 2,0 L/ha ó 2,0 - 3,0 L/ha
Lupino	Antracnosis *(Colletotrichumlupini),* Mancha café *(Pleiochaetasetosa)*	0,5 L/ha
Raps o canola	Alternariosis *(Alternaria brassicae),* Esclerotiniosis *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0,5 - 1,0 L/ha
Vivero forestal *(Pinus radiata)*	*Fusariumcircinatum*	200 - 400 cc/100 L de agua
Ornamentales (Bulbos de lillium y tulipán)	Rizoctoniasis *(Rhizoctoniasolani)*	5 - 10 L/ha (superficie total)
	Roya *(Puccinia allí)* en tulipán Oidio *(Erysiphe sp., Spharotheca sp.)*	0,5 - 0,75 L/ha
	Botrytis sp., Penicillium sp., Fusarium sp.	200 cc/100 L de agua





CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO APLICACIONES AÉREAS

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/ha)
Trigo, cebada, avena y triticale	Royas o polvillos *(Pucciniastriiformis, Pucciniarecondita, Puccinia graminis),* Helmintosporiosis *(Helminthosporium gramineum),* Septoriosis *(Septoria tritici, Septorianodorum),* Oidio *(Erysiphe graminis)*	0,5
Papa	Tizón temprano *(Alternaria solani)*	0,5
Lupino	Antracnosis *(Colletotrichum lupini),* Mancha café *(Pleiochaeta setosa)*	0,5
Raps o canola	Alternariosis *(Alternaria brassicae),* Esclerotiniosis *(Sclerotinia sclerotiorum)*	0,5 - 1,0





Abril 2021 V 01