



pronutiva[®]
Crop Protection + BioSolutions

Programa exclusivo de UPL, que integra biosoluciones naturales (bioprotección + bioestimulantes + bionutrición), con productos convencionales de protección de cultivos para satisfacer o superar las necesidades del mundo real de la agricultura de hoy.



Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.
© Marca Registrada.

En caso de INTOXICACION: Llamar al fono: (2) 2635 3800 Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile o a RITA/CHILE a los fonos: (2) 2777 1994.

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí estén expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere. © Marcas Registradas.

CASA MATRIZ: El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago - Fono: 22560 4500 / www.upl-ltd.com/cl

NUEVO
DROPPER[®] 5% SC
TIDIAZURON



Resultados **sustentables** en tus cosechas

- Fitorregulador que promueve el incremento del tamaño y uniformidad de los frutos.
- Promueve resultados favorables al aumentar la firmeza sin generar efectos negativos en color de cubrimiento, sólidos solubles y condición de fruta en postcosecha.





¿Qué es Dropper® 5% SC?

Dropper® 5% SC, es un fitorregulador que en uva de mesa, actúa estimulando el crecimiento de brotes y elongación del racimo, cuando es aplicado tempranamente. Por otra parte, al ser aplicado sobre bayas incrementa consistentemente el tamaño de éstas. En otros frutales, actúa incrementando o uniformando calibre, de acuerdo con el momento de aplicación.

Composición:

Tidiazuron* 5% p/v (50g/L)
Coformulantes c.s.p 100% p/v (1 L)
*1-fenil-3—(1,2,3-tidiazol-5-il) urea

¿Cómo actúa Dropper® 5% SC?

Dropper® 5% SC, posee actividad citocínica responsable de la división celular. Dropper® 5% SC, fomenta el crecimiento de yemas laterales, así como el incremento del tamaño de bayas en uvas de mesa, frutos de cerezas, ciruelos, nogales, arándanos y kiwis.

Beneficios de Dropper® 5% SC:

- Fomenta el desarrollo foliar en diversas especies.
- Favorece el crecimiento de yemas laterales.
- Incrementa el tamaño y uniformidad de frutos de cerezos, kiwis, nogales y ciruelos.
- Incrementa el tamaño de bayas en uva de mesa y arándanos.

Ventajas de la formulación de Dropper® 5% SC:

- Formulación líquida (suspensión concentrada) fácil dosificación y manipulación.
- Evita tapado de boquillas muy finas (excelente granulometría).
- Buena miscibilidad.
- Excelente fitocompatibilidad.
- No deja residuos detectables a cosecha.
- Buena estabilidad química, inclusive entre pH 5 a 9 a temperatura ambiente.



CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO APLICACIONES TERRESTRES

Cultivos	Dosis	Observaciones
Uva de mesa en brotación	Promover crecimiento de brotes y elongación de racimos 10 - 14 cc/100 L agua	Aplicar desde puntas verdes hasta brotes de 15 cm, antes que el primordio floral se exprese. Realizar una segunda aplicación 5 - 7 días después de la primera, si fuera necesario. Aplicaciones por temporada en brotación: 2 máx. La concentración y momento de aplicación dependerán del objetivo y vigor del parronal. Mojamiento: 600 - 1.000 L de agua/ha.
Uva de mesa en crecimiento de bayas	Incrementar diámetro de bayas Red Globe: 5 -10 cc/100 L agua	Aplicar una vez finalizado el shatter, con bayas de 6 - 8 mm. Aplicaciones por temporada: 1. Mojamiento: 1.000 - 1.500 L de agua/ha, asegurando un buen cubrimiento de los tejidos tratados. Se puede aplicar en mezcla con adyuvante.
	Mejorar distribución de calibre: Thompson Seedless: 20 cc/ha	Aplicar con bayas de 5-6 mm. Aplicaciones por temporada: 1. Mojamiento sugerido: 1.000 - 1.500 L de agua/ha, asegurando un buen cubrimiento de los tejidos tratados.
Cerezo	Aumentar y uniformar calibre 10 - 20 cc/100 L agua Disminuir partidura y retrasar cosecha 20 cc/ 100 L agua	Aplicar 7 o 14 días después de plena flor. En primaveras templadas (<15°C en floración y post-cuaja), se recomienda aplicar 2 veces, 7 días después de plena flor y repetir a los 7 días, utilizando la concentración menor (10 cc/100 L). Intervalo de aplicación: 7 días. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento sugerido: 1.500 L de agua/ha.
Ciruelo	Aumentar y uniformar calibre 4 cc/100 L agua	Aplicar desde fruto tamaño "arveja" y repetir 10 días después. Intervalo de aplicación: 10 días. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento sugerido: 1.000 L de agua/ha
Nogal	Aumentar calibre y mejorar su distribución 80 cc/ha	Aplicar en plena flor / fruto de 3 - 4 mm Aplicaciones por temporada: 1. Mojamiento sugerido: 1.500 L de agua/ha.
Arándano	Aumentar calibre 12 cc/100 L agua	Aplicar 2 - 3 veces, entre plena flor y post-cuaja. Intervalo de aplicación: 10 días. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Mojamiento sugerido: 500 L de agua/ha.
Kiwi	Aumentar calibre y mejorar forma de frutos 6 - 10 cc/100 L agua	Aplicar 1 vez, considerando lo siguiente: 4 semanas después de plena flor: 6 cc/100 L de agua 5 semanas después de plena flor: 10 cc/100 L de agua. En primaveras templadas (<15°C en floración y post-cuaja) realizar 2 aplicaciones de máximo 6 cc/100L con un intervalo de 7 días. Intervalo de aplicación: 7 días. Aplicaciones por temporada: 2 máx. Mojamiento sugerido: 1.500 L de agua/ha.



NOCIVO

