

SIGNAFRESH® Y

Fertilizante Foliar

INFORMACIÓN GENERAL	
INGREDIENTE ACTIVO	Nitrógeno, Fósforo y Potasio
NOMBRE QUÍMICO	N, K ₂ O ₅ , P ₂ O ₅
GRUPO QUÍMICO	Macronutrientes
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	N: 1,5 % p/v; K ₂ O ₅ : 1,4% p/v; P ₂ O ₅ : 1,4% p/v Líquido Soluble (SL)
MODO DE ACCIÓN	Fertilizante Foliar
FABRICANTE/FORMULADOR	SBL BIO CO., LTD., República de Corea
DISTRIBUIDOR EN CHILE	UPL Chile S.A.
TOXICIDAD	No corresponde
ANTÍDOTO	No aparece. Tratamiento sintomático y de soporte.
AUTORIZACIÓN SAG N°	No corresponde

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

SIGNAFRESH® Y es un Fertilizante Foliar en base a NPK. Su formulación permite mejorar la actividad de la planta, potenciando la actividad de enzimas, lo que se traduce en una mejor calidad y condición de la fruta a cosecha. Favorece una maduración más homogénea de los frutos, concentrando la cosecha y disminuyendo los oreos en uva de mesa, uva pisquera, cítricos, cerezos, manzanos y ciruelos. La acción conjunta de sus componentes convierte a **SIGNAFRESH® Y** en una excelente herramienta para la obtención de mejores resultados en cuanto a concentración de azúcares, rendimiento y calidad.

RECOMENDACIONES DE USO:

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO		
CULTIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
Uva de mesa de color	100 a 200 cc/100L de agua con nebulizadora 1,0 a 2,0 L/ha con máquina electrostática	Aplicar en el fin del ablande de bayas o inicio de pinta y repetir a los 7 – 10 días. Usar un mojamiento de 1.000 L de agua por hectárea con nebulizador. Aplicaciones con maquina electrostática con mojamiento de 100 - 120 L de agua/ha.
Uva de mesa verde (blancas)	100 cc/100L de agua con nebulizadora 1,0 L/ha con máquina electrostática	Aplicar a inicio del ablande de bayas o inicio de pinta y repetir a los 7- 10 días. Usar un mojamiento de 1.000 L de agua por hectárea con nebulizador. Aplicaciones con maquina electrostática usar un mojamiento de 100 - 120 L de agua/ha.
Cítricos: Naranjos, Clementinos, Clemenules, Mandarinos (W. Murcott)	75 a 100 cc/ 100 litros de agua. 1,5 - 2,5 L/ha	Aplicar en inicio del quiebre de color y repetir a los 7 días. Preferir dosis máxima en Clementinos y Clemenules.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO (CONTINUACIÓN)

CULTIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
Cerezos	100 a 200 cc/100 litros de agua 1,0 a 2,0 L/ha	Aplicar 5 a 7 días antes de la cosecha, con suficiente agua para una buena cobertura, evitar escurrimiento (chorreo).
Manzanos	100 a 200 cc/100 litros de agua 1,0 a 2,0 L/ha	Aplicar 3 semanas antes de la fecha de cosecha y repetir a los 7 días.
Ciruelo europeo y Ciruelo japonés	133 cc/100 L de agua 2,0 L/ha	Aplicar 14 a 21 días antes de cosecha.
Nota: Las aplicaciones deben hacerse temprano en la mañana (evitar altas temperaturas) o en condiciones que propicien un secado lento. Para un óptimo resultado los manejos agronómicos deben conducir a favorecer una mejor condición para la maduración y coloración de la fruta.		

PREPARACION DE LA MEZCLA Y APLICACIÓN

Antes de usar agite bien el envase. Diluya el producto en agua. Vierta la mitad del agua necesaria en el tanque y luego adicione **SIGNAFRESH® Y**. Agregue el agua restante para completar y mezcle cuidadosamente.

Instrucciones de aplicación:

Aplique **SIGNAFRESH® Y** con suficiente agua para mojar la planta uniformemente, usando un equipo de aplicación terrestre o aéreo. Para la aplicación aérea utilizar y mantener las dosis por hectárea. No use surfactantes.

® Es Marca Registrada