Bee-6 (SL)

BIOESTIMULANTE NATURAL

COMPOSICIÓN	
Nitrógeno	0,07% p/p
P_2O_5	<0,04% p/p
K_2O	0,02% p/p

COMPOSICIÓN FÍSICO-QUÍMICA	
pH (10%) a 20°C:	4,1
Densidad a 20 °C:	1.100 g/L
Solubilidad a 20 °C:	100%

BEE 6® es una tecnología de biofermentación diseñada para favorecer la actividad de las abejas durante la floración. Su formulación incorpora un consorcio seleccionado de bacterias lácticas que, mediante una fermentación controlada, generan un perfil natural de compuestos volátiles y señales aromáticas con capacidad de estimular la respuesta de los polinizadores hacia las flores. Estos compuestos volátiles son señales que las abejas reconocen para localizar flores y aumentar su actividad como agente polinizante.

BEE 6® complementa la acción de las colmenas, optimizando la orientación y actividad de las abejas durante el período crítico de floración.

INSTRUCCIONES DE USO

Agite el producto antes de usar. Mezclar con agua en dosis recomendadas de acuerdo al tipo de cultivo/frutal.

Apto para aplicación aérea mediante drones agrícolas.

RESTRICCIONES DE APLICACIÓN

Evite mezclar con bactericidas.

METALES PESADOS			
Arsénico (As)	< 0,2 mg/kg	Níquel (Ni)	< 0,001 mg/kg
Cadmio (Cd)	0,3 mg/kg	Plomo (Pb)	< 0,5 mg/kg
Mercurio (Hg)	< 0,5 mg/kg	Cromo (Cr)	< 0,001 mg/kg

ALMACENAMIENTO


Tiempo de almacenamiento: 12 meses. Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado.

Cultivo	Momento de aplicación	Dosis L/ha	Concentración cc/100 L
BERRIES (Arándano, frutilla, frambueso)	Realizar la aplicación con un mínimo de 5% de floración	7 - 10	100
CAROZOS (Duraznero, ciruelo, cerezo, nectarín)			
POMÁCEAS (Manzano, peral)			
VIDES (Uva de mesa, uva de vino)			
OTROS (Nogal, kiwi, almendro, cítricos, palta, avellano europeo)			
HORTALIZAS (Oleaginosas, leguminosas y forrajeras detinadas a producciòn de semillas)		5 - 10	
CULTIVOS Y SEMILLEROS (Maíz, trigo, avena)			

(*) En el caso de cultivos dioicos o en polinización cruzada, asegurar porcentaje indicado en flor femenina o flores que fructificarán.

AUMENTO EN N° DE VISITAS

El pepino posee flores rastreras, las cuales son difíciles de polinizar. Para efectos de validación, se realiza una aplicación con 5% de floración con tres tratamientos:



Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos (Tukey, p < 0,005). BARRAS = ± EE.

TRATAMIENTOS	
T0	Testigo huerto
T1	5 L. Bee-6/ha
T2	10 L. Bee-6/ha

En las condiciones de esta validación, el promedio de visitas de abejas aumentó desde 1,9 visitas en el testigo hasta 8,7 y 11,2 visitas en los tratamientos BEE 6 a 5 y 10 L/Ha respectivamente.

PARA OBTENER ÓPTIMOS RESULTADOS, DOSIFICAR Y APLICAR SEGÚN INDICACIONES EN LA ETIQUETA

Fabricado por Fitotecnología Ftgl SpA.
Parcela 67 Lt. I PP San Dionisio, Comuna Colbún
+56 9 3344 8944 contacto@fitological.com
WWW.FITOTECNOLOGIA.COM

FITOTECNOLOGÍA® AGRICULTURA SUSTENTABLE

V_092026