

AminoQuelant®-Ca

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FERTILIZANTE LÍQUIDO	
Categoría	Corrector de carencias de calcio
Modo de acción	Aminoácidos de acción sistémica
Formulación	Concentrado soluble (SL)
Fabricante/formulador	BIOIBERICA S.A. – ESPAÑA
Distribuidor en Chile	AGROCONNEXION SPA
Toxicidad	Producto que no ofrece peligro

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	
ELEMENTO	% P/P
Aminoácidos libres*	4,6
Nitrógeno total	4,9
Nitrógeno nítrico	3,9
Óxido de calcio (CaO) soluble	8
Boro	0,2

*L-a-aminoácidos con pureza sobre 98%

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	
pH	5,2
Densidad a 20° C	1,25 g/mL
Solubilidad en Agua	100%

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Gracias al aporte conjunto de calcio (Ca) con aminoácidos obtenidos mediante tecnología Enzyneer® presentes en AminoQuelant®-Ca, permite que la planta absorba rápidamente estos elementos favoreciendo además su transporte a los órganos de crecimiento del vegetal donde son requeridos. Ideal para usar en la corrección y prevención de las deficiencias de Ca en cultivos exigentes como: necrosis en bordes de hojas jóvenes o tip-bum (lechuga, apio, fresón), pudriciones apicales (tomate, pimiento), bitterpit (manzana), picado y rajado (cerezo, cítricos, mango), etc. También se puede utilizar como correctores de suelos sódicos y salino-sódicos aportando Ca activo al complejo de cambio y reduciendo el porcentaje de sodio intercambiable, así como el riego con agua con alto contenido en sales.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad

Es compatible con la mayoría de los productos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

Precauciones

Mantener el producto a condiciones de temperatura y humedad normales de almacenaje.

Presentación

1,5, 20 y 120 L



INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES
Frutales	3 – 4 L/ha	Aplicar en caída de pétalos, 30 días después de cuaja y 30 días antes de cosecha, para corregir Bitter pit, pitting, cracking. Aumentar firmeza y vida post cosecha.
Vides de mesa y vinífera		Aplicar en pre-flor, bayas de 4 – 6 mm (junto con aplicaciones de AG3) y en bayas de 8 – 10 mm (junto con aplicaciones de AG3), para corregir deficiencias de calcio, favorecer condición de vida post cosecha: desgrane, pudriciones, hair-line, etc.
Berries	2 – 3 L/ha	Aplicar en fruto en desarrollo y en pinta, para corregir necrosis apical, frutos blandos y aumentar firmeza y vida post cosecha.
Hortalizas de fruto		
Hortalizas de hoja	0,5 – 1,5 L/ha	Aplicar en crecimiento vegetativo para corregir corazón negro, firmeza de lámina, necrosis foliar terminal, etc.

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.

WWW.AGROCONNEXION.CL • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: agro@agroconnexion.cl