



**INSTRUCCIONES DE USO LANDIA® AÉREO** ESTÁ INDICADO PARA EL CONTROL DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES INDICADAS EN EL CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO, EN LOS CULTIVOS MENCIONADOS EN ESTE. SUS PEQUEÑAS PARTÍCULAS PERMITEN REALIZAR SUS CUALIDADES OBTENIÉNDOSE UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME Y UNA ÓPTIMA ADHERENCIA SOBRE LA SUPERFICIE DE LAS HOJAS, SARMIENTOS Y FRUTOS.

### CUADRO DE RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA / OBJETIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
CEREZO, NECTARINOS CIRUELO, DAMASCOS	Prevención de arañas: Araña roja europea (Panonychus ulmi) Araña bimaclada (Tetranychus urticae)	20 - 25 kg/ha	Aplicar al observar la presencia de araña, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de caminos con alta presión de polvo. Monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Repetir cada 10-15 días. Repetir no más de 12 veces en la temporada.
MANZANO	Prevención de arañas: Araña roja europea (Panonychus ulmi). Araña bimaclada (Tetranychus urticae)	20 - 25 kg/ha	Aplicar al observar la presencia de araña, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de camino con alta presión de polvo. Monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Repetir cada 10-15 días. Repetir no más de 12 veces en la temporada.
MELÓN, SANDÍA, ZAPALLO, PEPINO	Prevención de arañas: Araña bimaclada (Tetranychus urticae) Araña carmín (Tetranychus cinnabarinus)	20 - 30 kg/ha	Aplicar al observar la presencia de araña, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de camino con alta presión de polvo. Monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Repetir cada 10-15 días. Repetir no más de 12 veces en la temporada.
	Oídio (Erysiphe (Uncinula) necator)	10 - 12 kg/ha	Aplicar en forma preventiva o al inicio de la manifestación de síntomas en el follaje. Repetir cada 7-14 días. Tiene efecto colateral sobre arañas. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada.
ZAPALLO ITALIANO, ALCACHOFA, ARVEJA, FREJOL	Oídio (Erysiphe (Uncinula) necator)	10 - 12 kg/ha	Aplicar en forma preventiva o al inicio de la manifestación de síntomas en el follaje. Repetir cada 7-14 días. Tiene efecto colateral sobre arañas. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada.
NARANJO, LIMONERO, MANDARINO, POMELO	Prevención de arañas: Araña roja de los cítricos (Panonychus citri). Ácaro ancho (Polyphagotarsonemus latus). Falsa araña roja de la vid (Brevipalpus chilensis). Prevención del ácaro de la yema (Eriophyes sheldoni)	20 - 40 kg/ha	Tiene efecto supresor colateral sobre arañas. Monitorear la presencia de araña, sobre todo en sectores con polvo. Aplicar al observar su presencia, comenzando en sectores con antecedentes a orillas de caminos con alta presión de polvo. Repetir cada 10 - 15 días y no más de 12 veces en la temporada.
PALTOS	Araña roja del palto (Oligonychus yothersi)	20 - 40 kg/ha	Aplicar al observar la presencia de araña, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de caminos con alta presión de polvo. Desde fines de enero, se debe monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Repetir cada 10-15 días y no más de 12 veces en la temporada.
TOMATE	Eriofido del tomate (Aculops Lycopersici)	15 - 30 kg/ha	Aplicar según condiciones cada 10-15 días, de acuerdo con la presión de la plaga. Repetir no más de 12 veces en la temporada.
	Oídio (Erysiphe (Uncinula) necator)	10 - 12 kg/ha	Aplicar en forma preventiva o al inicio de la manifestación de síntomas en el follaje. Repetir cada 7-14 días. Tiene efecto colateral sobre arañas. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada.
PAPA	Oídio (Erysiphe (Uncinula) necator)	10 - 12 kg/ha	Aplicar según condiciones cada 10-15 días. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada.
REMOLACHA AZUCARERA	Oídio (Erysiphe (Uncinula) necator)	5 - 8 kg/ha	Aplicar en forma preventiva al observar los primeros síntomas. Repetir cada 10-15 días. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada.
PARRONALES - VID	Prevención de la Erinosis de la vid (Colomerus vitis). Prevención de arañas: Araña roja de la uva de mesa (Oligonychus vitis). Falsa araña roja de la vid (Brevipalpus chilensis)	15 - 20 kg/ha	Tiene efecto supresor colateral sobre arañas. Monitorear la presencia de araña, sobre todo en sectores con polvo. Aplicar al observar su presencia, comenzando en sectores con antecedentes a orillas de caminos con alta presión de polvo. Repetir cada 10-15 días. Aplicar no más de 12 veces en la temporada.
	Oídio (Erysiphe (Uncinula) necator)	15 - 20 kg/ha	Aplicar preventivamente con brotes desde 10 a 15 cms, repitiendo con intervalos de 7 a 10 días o cada nuevo crecimiento vegetativo. Utilizar las dosis mayores según desarrollo vegetativo y severidad de la infección. Repetir no más de 12 veces en la temporada.
ROSAS, CLAVELES	Prevención de arañas, Araña bimaclada (Tetranychus urticae). Araña carmín (Tetranychus cinnabarinus)	20 - 30 kg/ha	Aplicar según condiciones cada 10-15 días, de acuerdo con la presión de la plaga. No aplicar en plena flor. Repetir no más de 12 veces en la temporada.
CRISANTEMOS, GLADIOLOS, ROSAS	Oídio (Erysiphe (Uncinula) necator)	10 - 12 kg/ha	Aplicar según condiciones cada 10-15 días, de acuerdo a la presión de la enfermedad. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada.
VIVEROS FORESTALES (PINUS RADIATA )	Oídio (Erysiphe (Uncinula) necator)	10 - 12 kg/ha	Aplicar según condiciones cada 10-15 días. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada.



## APLICACIÓN AÉREA

CULTIVO	PLAGA / OBJETIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
PARRONALES - VID	Prevención de la Erinosis de la vid (Colomerus vitis) Prevención de arañas Arañita roja de la uva de mesa. (Oligonychus vitis) Falsa arañita roja de la vid (Brevipalpus chilensis)	15 - 20 kg/ha	Tiene efecto supresor colateral sobre arañas. Monitorear la presencia de araña, sobre todo en sectores con polvo. Aplicar al observar su presencia, comenzando en sectores con antecedentes a orillas de caminos con alta presión de polvo. Repetir cada 10-15 días. Aplicar no más de 12 veces en la temporada.
	Oídio (Erysiphe (Uncinula) necator)	15 - 20 kg/ha	Aplicar preventivamente con brotes de 15 cm. Repitiendo con intervalos de 7-10 días o a cada nuevo crecimiento vegetativo. Utilizar las dosis mayores según desarrollo vegetativo y severidad de la infección. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada.
REMOLACHA AZUCARERA	Oídio (Erysiphe (Uncinula) necator)	5- 8 kg/ha	Aplicar en forma preventiva al observar los primeros síntomas. Repetir cada 10-15 días. Aplicar un máximo de 12 veces en la temporada.
PALTOS	Arañita roja del palto (Oligonychus yothersi)	20 - 40 kg/ha	Aplicar al observar la presencia de araña, comenzando en sectores con antecedentes y orillas de camino con alta presión de polvo. Monitorear su presencia sobre todo en sectores con polvo. Repetir cada 10-15 días. Aplicar no más de 12 veces en la temporada.

Utilizar las dosis mayores según desarrollo vegetativo y severidad de la infección. Periodo de Reingreso: Las personas y animales no deben ingresar al área tratada antes de 24 horas después de la aplicación. Incompatibilidad: incompatible con Dinotrofenoles, Fenvalerato, Clorpirifos, Dimetoato y Aceites minerales. No aplicar antes de transcurridas 2 semanas de una aplicación de aceite, excepto si los tratamientos se realizan en periodo de dormancia. Para cítricos no aplicar antes de 21 días de alguna aplicación de aceite. No aplicar sobre cucurbitáceas (melón, sandía, pepino y zapallo) cultivados bajo condiciones de invernaderos. Fitotoxicidad: no es fitotóxico a las dosis y en las épocas señaladas. Evite su uso en condiciones de temperatura alta (30oC o más) y sobre follaje humedecido. Periodo de carencia: no tiene restricciones de carencia en los cultivos recomendados.

