

FOSFIMAX® 40-20

Nombre comercial	FOSFIMAX 40-20
Grupo	Fertilizante Foliar
Tipo	Fosfito
Grado	Agrícola
Comercializado por	Bioamerica® S.A.

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	%(p/p)	%(p/v)
*Fósforo (P ₂ O ₅)	40,0	57,6
Potasio (K ₂ O)	20,0	28,8

*Fósforo equivalente a 639 gr. de Fosfito / L

Densidad a 20°C: 1,49 g/ml

pH al 1% a 20°C: 2,25

Solubilidad: 100%

Formulación	Concentrado Soluble - SL
Modo de Acción	Absorción foliar y radicular

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

FOSFIMAX 40-20 es un Fertilizante Foliar con alto contenido en Fósforo y Potasio, 100% solubles, donde todo el Fósforo procede del anión fosfito (H₂P₀₃). FOSFIMAX 40-20 actúa como activador de las defensas de las plantas.

La elevada calidad de fabricación permite a FOSFIMAX 40-20 ser absorbido rápidamente por el follaje, para posteriormente translocarse acropétala y basipétalmente.

La elevada riqueza en Fósforo hace de FOSFIMAX 40-20 un producto idóneo para su empleo durante todo el ciclo de cultivo y particularmente para los momentos de fructificación por su contenido de potasio. La penetración del producto es muy rápida, dado que, 30 minutos después de la aplicación ha penetrado más del 85% del producto evitando el lavado por lluvia.



FOSFIMAX® 40-20

RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos

CULTIVO	DOSIS L/ha	CONCENTR. cc/100 L	VÍA RIEGO	OBSERVACIONES	
Manzano, Peral	3,0 - 5,0	200 - 300	6 - 10 L/ha	Aplicar desde brotación en adelante cada 20 días. En manzano aplicar 45-30 y 15 días antes de cosecha.	
Cerezos, Carozos				Aplicar en postcosecha.	
Uva, Kiwis				Aplicar con brotes de 20 - 30 cm. y repetir a los 20 a 30 días.	
Nogal	3 - 4	150		Desde fines de Noviembre, cada 30 días.	
Cítricos	3 - 5	200 - 300		Iniciar las aplicaciones si las condiciones de humedad son favorables para el desarrollo de la afección. Cada 20 a 30 días. Con presencia de la afección: cada 10 a 15 días.	
Paltos	6 - 10			Aplicar con actividad vegetativa, desde Febrero (postfloración hasta otoño)	
Frambuesa, Arándano, Frutilla	2,0 - 4,0			En postcosecha y 20 días después.	
Tomate	1,0 - 3,0			200 - 300	Aplicar en almaciguera con un par de hojas verdaderas, al plantar y repetir cada 7 días. En presencia de afección: cada 7 a 10 días.
Melón, Sandía Zapallo					
Cebolla, Ajo					
Lechuga					
Repollo, Coliflor Brócoli					
Papa					
Pimiento					



FOSFIMAX® 40-20

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Aplicaciones múltiples de FOSFIMAX 40-20 son más efectivas que una sola aplicación. Aplicaciones al suelo de FOSFIMAX 40-20 según recomendación de equipo técnico.

Aplicar utilizando suficiente agua para mojar completamente el follaje de las plantas. En el caso de condiciones extremas, usar las dosis máximas o repetir las aplicaciones a intervalos más cortos. FOSFIMAX 40-20 es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas excepto con correctores tipos sales de zinc, dicofol, dimetoato, aceites y cobres.

ADVERTENCIAS

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

Envases: 1 - 5 - 20 L

