

DEFENDER® BORO

Nombre comercial	DEFENDER BORO
Grupo	Fertilizante Foliar
Tipo	Corrector Nutricional Foliar
Grado	Agrícola
Comercializado por	Bioamerica® S.A.

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	%(p/p)	%(p/v)
* Boro (B)	11,0	14,85

*Complejado con etanolaminas

Densidad a 20°C: 1,35 g/ml

pH al 1% a 20°C: 8,44

Solubilidad: 100%

Formulación	Concentrado Soluble - SL
Modo de Acción	Absorción Foliar

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

DEFENDER BORO es un fertilizante foliar a base de Boro, de rápida y efectiva absorción, debido que está específicamente complejado con etanolaminas. La formulación de DEFENDER BORO es 100% soluble, no deja depósitos, permitiendo una pulverización segura a brotes, hojas y frutos.

La fertilización foliar con DEFENDER BORO permite aplicar Boro fácilmente disponible para sus Cultivos y Frutales, para corregir deficiencias nutricionales de este elemento.



DEFENDER® BORO

RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos

CULTIVO	OBJETIVO	ÉPOCA DE APLICACIÓN	DOSIS		OBSERVACIONES	
			L/ha	cc/100L		
Pomáceas, Kiwis	Mejorar cuaja.	Desde botón floral.	1,0 - 3,0	80 - 150	Se recomienda aplicarlo junto a DEFENDER Calcio. Incremento del contenido de azúcar.	
	Potenciar el transporte del calcio y calidad de frutas.	Desde inicio de crecimiento de frutos.				
	Potenciar acumulación de reservas. Mejorar cuaja.	Post-cosecha temprana. Racimo expuesto a inicio de floración.				
Vides	Potenciar el transporte del calcio para mejorar firmeza de bayas.	Inicio de Crecimiento de bayas y Pinta.		100 - 150	Permite homogenizar madurez en el racimo y aumentar la materia seca.	
	Incrementar Brix.	Inicio de Pinta y Precosecha.				
Carozos, Cerezos	Mejorar cuaja.	Desde botón floral.		80 - 150	Se recomienda aplicarlo junto a DEFENDER Calcio. Incremento del contenido de azúcar.	
	Mejorar firmeza y calidad de frutos.	Desde caída de pétalos en adelante.				
	Aumentar las reservas.	Post-cosecha temprana.				
Avellano, Nogal, Almendro	Mejorar cuaja.	Desde inicio de floración.		0,75 - 1,0	100 - 150	Repetir a los 20 y 40 días después.
Olivos, Cítricos, Paltos, Arándanos, Frutillas, Frambuesas	Corrección foliar.	Desde botón floral.				
Tomates, Pimientos, Melón, Sandía, Zapallo	Mejorar cuaja.	Desde inicio de floración.				
Apio	Calidad de planta.	Iniciar aplicaciones con 30 cm de altura de plantas.	0,75 - 1,0	100 - 150	Repetir a los 15 y 30 días. Ideal combinar esta aplicación con DEFENDER Calcio.	
Maíz	Mejorar cuaja.	Inicio de emisión de seda.			Aplicar junto a DEFENDER Zn.	
Trigo	Mejorar cuaja.	Inicio de macolla e inicio de aparición de la espiga.			Realizar 2 aplicaciones cada 12 días.	
Raps	Mejorar cuaja.	Estado de roseta e inicio de flor.			Repetir a los 20 días.	
Remolacha	Potenciar la translocación de azúcar.	A partir de 4 - 6 hojas verdaderas. Desde mediados de Enero.			Repetir a los 20 y 40 días.	
					Repetir a los 20 y 40 días.	



DEFENDER® BORO

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Aplicar DEFENDER BORO mediante aspersión foliar utilizando suficiente agua para mojar bien todo el follaje de las plantas. No aplicar DEFENDER BORO cuando las plantas o árboles estén bajo condiciones de estrés, sea debido a falta de agua, temperatura o humedad.

DEFENDER BORO debido a su formulación, puede ser aplicado mediante equipos pulverizadores electrostáticos. DEFENDER BORO es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados, no obstante se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

ADVERTENCIAS

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

Envases: 5 - 20 L

