

ZOBERAMINOL® 80 SP

Nombre comercial	ZOBERAMINOL 80 SP
Grupo	Fertilizante Foliar
Tipo	Bioestimulante
Grado	Agrícola
Comercializado por	Bioamerica® S.A.

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	%(p/v)
L- α - aminoácidos libres	80,0
Nitrógeno total (N)	12,0
Nitrógeno orgánico (N)	9,6
Materia orgánica total	90,0
Potasio (K ₂ O)	3,4

Densidad a 20°C: 0,5 g/ml
pH al 0,2 % a 20°C: 5,1

Formulación	Polvo Soluble - SP
Modo de Acción	Absorción Foliar y Radicular

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

ZOBERAMINOL 80 SP es un bioestimulante a base de L-aminoácidos libres formulado como Polvo Soluble SP, para aplicación vía foliar y/o radicular. ZOBERAMINOL 80 SP estimula la planta de forma natural, liberándola de situaciones de estrés, potenciando su desarrollo y aumentando la productividad. En mezclas con fitosanitarios potencia su eficiencia.

ZOBERAMINOL 80 SP incorpora nuevas tecnologías en su composición, formulación y presentación, ya que es el producto con mayor concentración de L-aminoácidos en el mercado, pionero en su formulación Polvo Soluble. Estas características hacen de ZOBERAMINOL 80 SP un producto a la vanguardia de la agricultura actual.



ZOBERAMINOL® 80 SP

RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	Dosis kg/ha	Concentración cc/100L
Uva de Mesa	4 aplicaciones: 2 en brotación y 2 en crecimiento de las bayas para estimular el crecimiento vegetativo y calibre.	0,5 - 1,0	50 - 100
Uva Vinífera	3 aplicaciones: 2 en brotación y 1 en tinta.		
Cítricos	3 aplicaciones dos semanas antes de floración, cuaja y crecimiento de los frutos.		
Frutos de Carozos	4 aplicaciones: En brotación, cuajado y raleo.		
Avellano, Nogal, Manzanos, Peral y Kiwi	En brotación, crecimiento de frutos y post cosecha.		
Arándano, Frambuesa y Frutilla	En brotación, crecimiento de frutos y post cosecha.		
Olivo	3 aplicaciones: En el crecimiento de los frutos.		
Huertos en formación y Viveros	Cada 15 a 20 días desde inicio de brotación.	0,25 - 0,5	
Papa	4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo.		
Arroz, Trigo y Cebada	2 aplicaciones en inicio de macolla y llenado de grano.		
Alfalfa	Después del segundo corte. Aplicar 7 - 10 días después de cada corte 2 a 3 aplicaciones.		
Hortalizas y Tomate de industria	1 aplicación cada 20 días.		
Frutilla	3 - 4 aplicaciones durante el ciclo de cultivo.		
Melón y Sandía	3 aplicaciones antes de floración y 2 en el crecimiento de los frutos.		
Otros Cultivos	Desde primer par de hojas verdaderas.		

Aplicar vía riego: 2-4 kg/ha por temporada en Hortalizas, Cultivos y Berries, 4-6 kg/Ha por temporada en Frutales.

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Aplicar vía foliar, utilizando suficiente agua para mojar completamente el follaje de las plantas, sin sobrepasar el punto de goteo. Zoberaminol 80 SP es compatible con la mayoría de los insecticidas, acaricidas, fungicidas y fitohormonales. Depositar el contenido de la bolsa en el tanque aplicador con el agitador funcionando a un tercio de su capacidad.



ZOBERAMINOL® 80 SP

PRECAUCIONES

No mezclar con aceite, azufre y cobre. Almacenar el producto en lugar seco y fresco y fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con piel y ojos y lavar las manos después de cada aplicación. No ingerir.

ADVERTENCIAS

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

Envases: 1 Kg

