



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FITORREGULADOR	
Ingrediente activo	6 – Benciladenina
Nombre / Grupo químico	Benciladenina / Giberelinas y Citoquininas
Modo de acción	Fitorregulador de acción sistémica
Formulación	Concentrado soluble (SL)
Fabricante/formulador	FINE AGROCHEMICALS LTD. – INGLATERRA
Distribuidor en Chile	AGROCONNEXION SPA
Toxicidad	IV: Producto que normalmente no ofrece peligro
Autorización SAG	N° 4.234

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN QUÍMICA	
ELEMENTO	% P/V
6 – Benciladenina	2,12 (21,2 g/L)
Coformulantes, c.s.p.	100 (1 L)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Exilis® es un raleador de post floración en manzanos y perales. Además Exilis® es un promotor del crecimiento de frutos de manzanos, olivos, paltos y uva de mesa (variedad Red Globe y Crimson Seedless). Como raleador Exilis® puede ser usado como tratamiento complementario a otros métodos de regulación de carga frutal.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad

Compatible con tensioactivos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

Carencia

No tiene. Exilis® es un fitoregulador para ser aplicado entre floración y los primeros estados de desarrollo del fruto (hasta 30 días después de floración aproximadamente).

Reingreso al área tratada

Se puede reingresar al área tratada cuando se haya secado la aplicación sobre el follaje, aproximadamente 12 horas después. No tiene restricciones para el reingreso de animales.

Precauciones

Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de alimentos, semillas u otros productos. Mantener lejos del alcance de niños, o personas no responsables y de mascotas.

Presentación

10 L

® Marca Registrada de FINE AGROCHEMICALS. LTD.



INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	OBJETIVO	OBSERVACIONES
Manzanos y Perales	6 – 12 L/ha	Raleo	Realizar 1 o 2 aplicaciones cada 7–10 días en fruto rey de 5 a 15 mm de diámetro. Usar 1.200 L/ha de mojamiento.
Manzanos	0,6 – 3 L/ha	Aumento de tamaño de frutos	Realizar 2 a 4 aplicaciones cada 3–10 días. Aplicar desde caída de pétalos con 1200 L/ha de mojamiento.
Olivos	1,5 – 2,3 L/ha	Promotor de crecimiento	Aplicar cuando las panículas están en su fase de expansión con inicio de floración. Utilizar la dosis menor en casos de baja floración y la mayor en casos de floración alta. Aplicar con mojamiento de 1000 L/agua/ha. Realizar máximo una aplicación por temporada.
Paltos	1,9 L/ha	Promotor de crecimiento	Aplicar en periodo de pre-floración cuando las panículas están en pleno desarrollo (10% de las panículas más adelantadas presenten un brote vegetativo no mayor a 5 cm). Aplicar con un mojamiento de 2000 L agua/ha. Realizar máximo una aplicación por temporada.
Uva de mesa (Red Globe y Crimson seedless)	340 cc/ha en cada aplicación	Promotor de crecimiento	Aplicar cuando el 100% de los racimos estén con la cuaja definida, (Red Globe 8-10 mm, 12-14 ó 18 -20 mm), (Crimson seedless 6-8 mm y 10-12 mm). La aplicación debe ser dirigida a los racimos con un mojamiento de 600 L agua/ha. Con electrostática usar 100 L agua/ ha. Realizar máximo 2 aplicaciones por temporada cada 7 días.

Recomendaciones de uso

No aplicar con pH del agua 8,0 o superior. De ser necesario, se recomienda el uso de INDICATE-5® para bajar el pH de la mezcla a 5 – 6,5.
Es recomendable el uso de un tensioactivo para mejorar el cubrimiento de la aplicación.

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.

WWW.AGROCONNEXION.CL • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: agro@agroconnexion.cl