

KYTEX®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FERTILIZANTE FOLIAR	
Categoría	Fertilizante líquido de aplicación foliar
Modo de acción	Corrector nutricional de acción sistémica
Formulación	Concentrado soluble (SL)
Fabricante/formulador	ADRIATICA SPA – ITALIA
Distribuidor en Chile	AGROCONNEXION SPA
Toxicidad	Producto que no ofrece peligro

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	
ELEMENTO	% P/P
Óxido de calcio (CaO)	6,5
Óxido de potasio (K ₂ O)	3,2
Óxido de magnesio (MgO)	1,2
Trióxido de azufre (SO ₃)	1
Carbohidratos (disacáridos)	2,5
Aminoácidos libres	1,5
Carbono	3
Nitrógeno orgánico	0,8

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	
pH	6,5
Densidad a 20° C	1,43 g/mL
Solubilidad en Agua	99%

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Kytex® es un formulado líquido de altísima pureza para aplicaciones foliares en todos los cultivos. Previene el estrés oxidativo de origen fisiológico producido por fenómenos ambientales extremos, como exceso de temperaturas y radiación.

Gracias a su acción osmoprotectora, sumado al aporte balanceado de Calcio, Potasio, Magnesio y Azufre, contribuye a la mitigación de los efectos negativos del estrés oxidativo en las plantas, reduciendo la incidencia de microlesiones y retardando los procesos de senescencia, como ablandamiento prematuro de frutos, pardeamiento y deshidratación de los tejidos tanto en la cosecha como en postcosecha de frutales y hortalizas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad

Es compatible con la mayoría de los productos. Evitar mezclas con productos alcalinos, cobres y aceites minerales.

Precauciones

Mantener el producto a condiciones de temperatura y humedad normales de almacenaje.

Presentación

6 y 20 Kg



CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES
Vides de mesa y vinífera	4 – 6 Kg/ha por aplicación Completar al menos 12 Kg/ha por temporada	2 a 3 aplicaciones en: - Pre-cierre de racimos. - Inicio de Pinta. - Pre-cosecha.
Cerezo		2 aplicaciones en: - Fruto de color pajizo. - 7 días después.
Arándano		3 a 5 aplicaciones en: - Cuaja. - Cada 7 a 15 días.
Durazno Nectarines		2 a 3 aplicaciones: - Crecimiento de frutos. - Inicio de pinta. - Pre-cosecha.
Manzano Peral		2 a 3 aplicaciones: - Pre-pinta. - Cada 15 días.
Palto Cítricos		2 a 3 aplicaciones previo a la época de mayor estrés por exceso de temperatura y/o déficit hídrico.
Hortalizas de fruto		2 a 3 aplicaciones en: -Cuaja / Crecimiento de fruto. -Pinta / Maduración. -Pre-cosecha.
Hortalizas de hoja		2 a 3 aplicaciones en: - 10-15 días después del trasplante. - Durante el crecimiento. - Pre-cosecha.

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.

WWW.AGROCONNEXION.CL • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: agro@agroconnexion.cl