



Ficha Técnica Herbicidas

Karmex® 80 WG

KARMEX® 80 WG

INGREDIENTE ACTIVO	Diuron
NOMBRE QUIMICO	3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea
GRUPO QUIMICO	Ureas
CONCENTRACION Y FORMULACION	800 g/ Kg
MODO DE ACCION	Sistémico
FABRICANTE/ FORMULADOR	DUPONT DO BRASIL LTDA. / DUPONT DE COLOMBIA S.A. / MAKHTESHIM AGAN OF NORTH AMERICA INC
DISTRIBUIDOR EN CHILE	Adama Chile S.A.
TOXICIDAD	Grupo IV Productos que normalmente no ofrecen peligro LD50 producto comercial: Dato no disponible.
ANTIDOTO	No tiene antídoto específico. Tratamiento base.
AUTORIZACION SAG N°	3477

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

KARMEX® 80 WG, es un herbicida selectivo, de acción residual que actúa inhibiendo la fotosíntesis de las malezas sensibles y que debe ser aplicado al suelo bien preparado, con buena humedad, mullido y antes de que las malezas emerjan. Es absorbido por las raíces de las malezas en activo crecimiento. El suelo, una vez aplicado no debe moverse.

KARMEX® 80 WG, controla malezas anuales: quinguilla, bleado, verdolaga, ambrosia, pata de gallina, hualcacho, capulli, quilloy-quilloy, linacilla, bolsita de pastor, enredadera, cerastio, piojillo, pasto oloroso, pega-pega, cola de ratón, pasto miel, yuyo, duraznillo anual, ñilhue anual, falsa achicoria, manzanilla, rábano y sanguinaria.

ADAMA



Ficha Técnica Herbicidas Karmex® 80 WG

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS (kg/há)	OBSERVACIONES
Alcachofa	2 a 4	Otoño o inicios de invierno, sobre suelo mullido, húmedo y bien preparado. Dirigir la aplicación para cubrir el área entre las hileras y en la base de las plantas, evitando mojar el follaje del cultivo.
Alfalfa	2 a 3	Solo aplicar en alfalfa establecida de más de un año. En invierno, con alfalfa en latencia, después de un corte.
Cebada, Trigo, Avena	1 a 1.5	Inmediatamente después de la siembra en cultivos de invierno. No sembrar ningún otro cultivo dentro de un año después de la última aplicación (excepto los indicados).
Espárragos	2 a 4	No aplicar en espárragos recién establecidos de semillas, o en plantas con raíces expuestas. En esparragueras nuevas trasplantadas, aplicar 3 a 4 kg/ ha en suelos arcillosos o con alto contenido de materia orgánica, sobre suelo libre de malezas, mullido y húmedo. No aplicar en suelos con menos del 2% de materia orgánica, o cuando la planta trasplantada ha quedado a una profundidad menor a 5 cms. En plantaciones establecidas, en suelos pesados o con alto contenido de materia orgánica, aplicar alrededor de un mes antes que aparezcan los primeros espárragos, sobre suelo limpio, mullido y húmedo. Una segunda aplicación puede realizarse inmediatamente después de la cosecha, sobre suelo libre de malezas y húmedo. Regar si no llueve dentro de las dos semanas siguientes a la aplicación.
Festuca, Pasto ovillo	1 a 2	Durante el receso vegetativo en otoño-invierno, para el control de malezas anuales y plántulas de resiembra en semilleros de más de un año.
Gladiolo	1 a 2	Sobre suelo húmedo y libre de malezas.
Durazneros, Ciruelos, Nectarinos, Damascos	3 a 5	En árboles de más de 3 años de plantados
Cítricos (limoneros, naranjos, mandarinos y pomelos), manzanos, perales y nogales	3 a 5	En arboles de más de un año de plantados. Usar las menores dosis en suelos livianos.
Viñedos, Parronales	3 a 4	En parras de más de 3 años de plantadas. No usar en suelos con menos de 2% de materia orgánica, ni en plantas con diámetro de tronco menor a 4 cm, con raíces expuestas.
Drenes, Canales de regadío	10 a 20	Otoño-invierno, cuando el canal no esté en uso, después de una limpia.

ADAMA



Ficha Técnica Herbicidas Karmex® 80 WG

NOTA: Emplear las dosis menores en suelos livianos y las mayores en suelos pesados o con alto contenido de materia orgánica.

En cultivos, no aplicar en suelos arenosos o con menos de 1% de materia orgánica, ni en viñedos, parronales y espárragos cuyos suelos tengan menos de 2% de materia orgánica. Aplicar siempre en suelos bien preparados, mullidos, sin terrones, sin malezas presentes y con buena humedad o donde se esperen lluvias o riego artificial antes de 2 semanas después de realizada la aplicación de **Karmex 80 WG**.

No se recomienda hacer más de una aplicación de **Karmex 80 WG** al año por cultivo, a no ser que se indique lo contrario. Volumen de agua: utilizar un mojamiento de 200 lt/ ha. Preparación de la mezcla: Medir la cantidad necesaria de **Karmex 80 WG**, adicione ésta directamente al estanque aplicador a medio llenar o bien previamente disuelto en agua y con el agitador funcionando, por último terminar de llenar el tanque de agua.

Fitotoxicidad: **Karmex 80 WG** usado en los cultivos indicados y de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta no es fitotóxico al cultivo.

Incompatibilidad: **Karmex 80 WG** no posee incompatibilidades conocidas.

Compatibilidad: **Karmex 80 WG** es compatible con los principales herbicidas usados habitualmente en estos cultivos. Cuando en una misma zona se usan repetidamente herbicidas de un mismo modo de acción, podrá producirse la aparición de biotipos de malezas resistentes las cuales podrán propagarse y dominar en la zona. Para evitar o demorar la proliferación de estos biotipos, se recomienda prácticas culturales de rotación, prevenir los escapes e impedir que estos semillen, usar herbicidas de diferente modo de acción en los cultivos de rotación.

Periodo de carencia: Durazneros, Ciruelos 60 días; Cebada, Avena, Trigo, Festuca, Pasto Ovillo 60 días; Alcachofa, Alfalfa y Espárragos 30 días; Cítricos, Manzanos, Perales, Damascos, Viñedos, Parronales, Nogales y Nectarines 60 días; Gladiolos no corresponderá días de carencia. Debido a su época de uso, siempre se cumplirán los días de carencia establecidos en esta etiqueta.

Tiempo de Reingreso: Se recomienda esperar al menos 4 horas. Para animales, no corresponde considerar un tiempo de reingreso.

® Marca Registrada de Agan Chemical Manufacturers Ltd.

ADAMA