

## FICHA TÉCNICA

### **CENTEON MAX® (WP)**

**Bioestimulante de planta microbiano.  
Polvo mojable (WP)**

**CENTEON MAX® WP** es un bioestimulante biológico compuesto por *Trichoderma virens* y *Bacillus subtilis*, formulado en polvo mojable con amplia aplicabilidad sobre semillas y plantas, mejorando el desarrollo vegetativo. Activa el desarrollo de raíces. Su aplicación ayuda a superar deficiencias en el crecimiento de las plantas.

#### **Certificaciones**

Certificación Orgánica Ecocert y KIWA BCS  
Visado por S.A.G. para Uso en Agricultura Orgánica Nacional

#### **Composición WP**

<i>Trichoderma virens</i> cepa Luito	7 * 10 <sup>7</sup> UFC/g
<i>Bacillus subtilis</i> cepa N5	3 * 10 <sup>7</sup> UFC/g
Coformulantes c.s.p.	96,4% p/p (964 g/ kg)

## INSTRUCCIONES DE USO

Dosis	Número de aplicaciones	Época de aplicación	Cultivo
1 a 2 kg/ha (200 g/100 L de agua para uso en drenching)	No existe límite en el número de aplicaciones por temporada	Aplicar en plantaciones, al suelo o mediante inmersión de plantas o con el riego. En plantas establecidas, permite aplicaciones en brotación, desarrollo, cosecha y post-cosecha, a través de riego o aspersión al suelo. Considerar por hoyo de plantación 3 - 5 g/planta como espolvoreo.	Berries
1,5 a 2 kg/ha (500 g/100 L de agua para uso en drenching)		Aplicar en plantaciones, al suelo o mediante inmersión de plantas o con el riego. En plantas establecidas, permite aplicaciones en brotación, desarrollo, cosecha y post-cosecha, a través de riego o aspersión al suelo. Considerar por hoyo de plantación 3 - 5 g/planta como espolvoreo.	Frutales y Vides
1 a 2 kg/ha		Aplicar desde siembra a cosecha al suelo mediante aspersión.	Cultivos (Cereales; Oleaginosas; Papa)
2 a 5 g/L de agua		En almácigo aplicaciones desde siembra a trasplante.	Hortalizas
1 a 2 kg/ha		Aplicación en campo, pre-trasplante al sustrato o mediante inmersión de plántulas. Post-trasplante vía riego o drenching, en todas las etapas del cultivo.	
2 a 5 g/L de agua		Aplicaciones en vivero desde siembra a trasplante.	Forestales
1 a 2 kg/ha		Aplicación en campo, pre-trasplante al sustrato o mediante inmersión de plántulas. Post-trasplante vía riego o drenching, en todas las etapas del cultivo.	
2 a 5 g/L de agua		Aplicación en vivero desde siembra a trasplante.	Flores y Ornamentales
1 a 2 kg/ha	Aplicación en campo, pre-trasplante al sustrato o mediante inmersión de plántulas. Post-trasplante vía riego o drenching, en todas las etapas del cultivo.		

**Preparación de la mezcla:** Agitar en un balde con poca agua la cantidad necesaria de **CENTEON MAX® WP** a utilizar. Llenar el estanque de la bomba hasta la mitad con agua. Vaciar el contenido del balde al estanque y completar el volumen de agua revolviendo.

**Forma de aplicación:** Aplicar vía riego o drenching. Utilizar un volumen de mojamiento que permita el correcto cubrimiento de plantas, suelo y/o sustrato.

**Compatibilidad:** Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos, fungicidas y antibióticos. No mezclar **CENTEON MAX® WP** con plaguicidas y agroquímicos



---

sin realizar antes una prueba de compatibilidad o por instrucción del fabricante. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

**Fitotoxicidad:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

**Almacenaje:** Debe ser almacenado en ambiente fresco y seco por un máximo 12 meses. Mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta.

**Período de Carencia:** No tiene días de carencia, ni restricciones de reingreso.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS FONO: +56-2-26353800**  
**CITUC EMERGENCIAS QUÍMICAS FONO: +56-2-22473600 -**  
**ATENCIÓN LAS 24 HORAS BIO INSUMOS NATIVA SPA (+56-71)**  
**2970696/2970698.**

