

Basfoliar® Top N SL



Fertilizante corrector líquido

■ Nombre Comercial	Basfoliar® Top N SL
■ Nombre químico	Solución nitrogenada
■ Nombre Común	Basfoliar® Top N SL
■ Grado	AGRÍCOLA
■ Producido por	COMPO EXPERT GmBh
■ Comercializado por	COMPO EXPERT Chile Fertilizantes Ltda.

ANÁLISIS QUÍMICO

Nitrógeno Total.....	35 % p/v
N Urea Formaldehído	20,63% p/v
N Urea Común	14,38% p/v

ANÁLISIS FÍSICO

APARIENCIA	Líquido Transparente
PH (sol. 1:10 a 20°C)	9 - 11
DENSIDAD	1,25 g/cc
TOXICIDAD	NO TÓXICO, NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO y NO PELIGROSO
ENVASES	20 L

BENEFICIOS

Basfoliar® Top N SL está especialmente diseñado para la aplicación foliar, aunque también puede utilizarse vía fertirriego.

DESCRIPCIÓN

- Basfoliar® Top N SL es una solución de nitrógeno de liberación lenta, en forma de urea formaldehído, diseñado para aplicación foliar y vía riego.
- Basfoliar® Top N SL es más seguro, produce menos riesgo de quemaduras por exceso de concentración de nitrógeno, y mejora la eficiencia de la nutrición nitrogenada, ya que la liberación lenta del N ocurre tanto en el suelo como en el interior de la hoja.

PROPIEDADES Y VENTAJAS

- Tras la aplicación foliar, Basfoliar® Top N SL se absorbe al 100% en 24-48 horas. La porción de urea está lista para que la planta lo use una vez absorbida, y la porción de Urea Formaldehído permanece en la planta como metilo y polimetileno de urea, hasta que la planta pueda descomponerlo en unidades de N utilizables para el metabolismo del cultivo.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis/aplicación	Concentración	Nº Aplicaciones	Época de aplicación
Pomáceas	5-10 L/ha	0,50%	1 a 3	Desde fruto de 2,5 cm en adelante
Duraznos, Nectarines, Ciruelas	5-8 L/ha	0,50%	1 a 3	En plena brotación cada 10 días.
Cerezas	5 L/ha	0,30%	1 a 2	Postcosecha
Uva de mesa y vinífera	4-6 L/ha	0,60%	1 a 3	En brotación hasta antes de floración
Kiwi	6 L/ha	0,60%	1 a 3	En brotación hasta antes de floración
Cítricos	5-12 L/ha	0,3-0,5%	1 a 2	Previo a flash de crecimiento de primavera
Paltos	6-10 L/ha	0,3-0,5%	1 a 2	Cuaja y flash de desarrollo vegetativo
Nogales	4-10 L/ha	0,2-0,5%	1 a 2	Apoyo al crecimiento vegetativo y desde brote de aprox. 20 cm.
Berries	1-2 L/ha	0,15-0,2%	2	En plena brotación, cada 15 días
Post cosecha frutales y vides	10-12 L/ha	1%	1	En otoño, desde inicio de caída de hojas
Viveros	7,5 L/ha	0,5-0,7%	3 a 5	Durante el crecimiento de brotes
Apio	4-12 L/ha	1%	1 a 2	Durante el 1 ^{er} tercio del cultivo
Brásicas	8-12 L/ha	2%	1 a 2	Durante el 1 ^{er} tercio del cultivo
Lechugas	3 a 6 L/ha	0,80%	1 a 2	Durante todo el cultivo
Tomates	3 a 6 L/ha	1%	2 a 4	Durante el crecimiento de frutos
Remolacha	4 a 10 L/ha	0,5 a 2 %	1	Durante el 1 ^{er} tercio del cultivo
Cereales (trigo, arroz, cebada)	6 a 12 L/ha	2 a 3 %	1	Durante el período de macolla
Papas	3 a 4 L/ha	0,5 a 2 %	1	Durante la 2 ^{da} mitad del cultivo
Maiz de grano	6-12 L/ha	3%	1	Durante la 1 ^{ra} mitad del ciclo del cultivo
Maíz, maravilla, raps	5 L/ha	3%	1	Durante la 1 ^{ra} mitad del ciclo del cultivo

PRECAUCIONES

Se recomienda no utilizarlo con productos que contengan tebuconazol.

No es compatible con productos con pH muy bajos (sin previa prueba).

No es compatible con ácidos fosfóricos, nítricos, sulfúricos, fosfatos monoamónicos y monopotásicos.

Basfoliar® Top N SL es compatible con la mayoría de los fitosanitarios. En caso de dudas, se recomienda realizar pruebas previas.

Basfoliar® Top N SL es considerado no tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto para el manejo seguro es necesario atenerse a las precauciones de uso de los productos fitosanitarios con que haya sido mezclado Basfoliar® Top N SL.

Basfoliar® es Marca Registrada de COMPO EXPERT GmbH.