



FUNGICIDA



ADAMA

Ficha Técnica Fungicidas REGEV®



Principales Características

REGEV® Fungicida foliar híbrido preventivo y curativo residual para el control de un amplio espectro de enfermedades fúngicas de las plantas.

REGEV® es un fungicida compuesto por Aceite de Árbol del Té y Difenconazol. El Aceite de Árbol del Té posee actividad preventiva y curativa; mientras que el Difenconazol es un fungicida sistémico residual que provee acción preventiva duradera y acción curativa contra un amplio rango de enfermedades. Su uso está indicado para el cultivo de Tomates y Manzanos. En el control de *Venturia inaequalis* y *Venturia pirina*, además de actuar como preventivo, permite proteger sus manzanos después de iniciado un período de condiciones para el desarrollo de estas enfermedades, pues posee un efecto retroactivo de hasta 100 horas.

Ingrediente Activo

Aceite de Árbol del Té (*Melaleuca alternifolia*)* + Difenconazol**

Nombre Químico

**Melaleuca alternifolia* Terpinen
4-ol-1-metil-4-isopropil-1-ciclohexen-
4-ol (Razón enantiomérica
R):(S)=1:2)

y-terpineno 1-isopropil-4-
metilciclohexa-1,4-dieno

**Difenconazol

3-cloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4RS)-4-
metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-
1,3-dioxolan-2-il] fenil 4-clorofenil
éter.

Grupo Químico

• Monoterpenos monocíclicos
(Aceite de Árbol del Té); Triazoles
(Difenconazol).

Concentración y formulación

• 400 g/L + 200 g/L EC.

Modo de acción

• Contacto y Mesostémico



FUNGICIDA



ADAMA

Ficha Técnica Fungicidas REGEV®

Instrucciones de uso

Cultivos	Enfermedades	Dosis (L/ha)	Observaciones
Manzanos	Venturia	20 - 25 cc/100 L	Aplicar de forma preventiva a intervalos de 7-10 días, desde inicios de floración hasta fruto formado de 20-24 mm. Efectuar como máximo 4 aplicaciones por temporada. En aplicaciones preventivas y mojamientos menores a 1.500 L de agua/ha, utilizar dosis mínima a intervalos de 10 días y dosis máximas para aplicaciones curativas en intervalos de 7 días.
		300 - 375 cc/há	
Tomates	Oídio	45 - 75 cc/100 L 450 - 750 cc/há	Aplicar de forma preventiva a intervalos de 7-10 días, desde floración hasta fruto formado. Efectuar como máximo 4 aplicaciones por temporada. En aplicaciones preventivas y mojamientos menores a 1.500 L de agua/ha, utilizar dosis mínima a intervalos de 10 días y dosis máximas para aplicaciones curativas en intervalos de 7 días.



FUNGICIDA

REGEV®

Preparación de la Mezcla

Aplicar con un equipo convencional pulverizador/nebulizador bien calibrado teniendo cuidado de lograr un buen mojamiento del cultivo. Suspender la cantidad requerida de REGEV en el tanque del equipo ya lleno hasta la mitad con agua y con agitador funcionando, luego completar con agua sin dejar de agitar.

Precauciones de Aplicación para Abejas

Se recomienda aplicar temprano en la mañana antes de que se inicie el vuelo de las abejas o en la tarde cuando haya cesado. De no poder hacerlo, retirar colmenas cercanas al área a tratar previo a la aplicación.

FABRICANTE/FORMULADOR
Stockton (Israel) Ltd.

DISTRIBUIDOR EN CHILE
Adama Chile S.A.

TOXICIDAD Grupo III, Poco Peligroso.
LD₅₀>2.000 mg/kg (Oral y Dermal Ratas).

ANTIDOTO No tiene antídoto específico.
Tratamiento base.

AUTORIZACION SAG N° 2.959

Período de carencia (días)

Manzanos, 7 días
Tomates, 7 días

Tiempo de reingreso

Para las personas, se recomienda reingresar al área tratada 4 horas después de la aplicación. En caso de animales, no corresponde por el tipo de cultivo en el cual se aplica.

Compatibilidad

No ha presentado incompatibilidad con otros plaguicidas. Sin embargo, se recomienda siempre realizar previo a mezcla, una prueba de compatibilidad.

Fitotoxicidad

No presenta fitotoxicidad usado en los cultivos y a las dosis indicadas en el cuadro de instrucciones de uso.