

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
FT CACROP	01/2021	16.09.21

CALCICROP

CONTENIDO	: Calcio complejoado
CLASIFICACIÓN	: Solución de calcio complejoado
CONCENTRACIÓN (p/p)	: Calcio (CaO soluble en agua): 15%. Calcio (CaO por lignosulfonato sódico):15%
FORMULACIÓN	: Concentrado soluble (LS)
FABRICANTE/ FORMULADOR	: Agroindustrial Kimatec S.L. Edificio MAAVi Innovation Center: Paraje Cerro de los Lobos s/n 04738, Vúcar, España. Tel.: +349503469009. www.kimatecgroup.com
DISTRIBUIDOR EN CHILE	: Gowan Chile SpA, Riñihue 2.450, Bodegas 25 / 26, Los Pinos, Viña del Mar. Tel.: (56 - 32) 286 0698. www.gowan.cl
ANTIDOTO	: No tiene antídoto específico.
AUTORIZACIÓN SAG N°	: No tiene.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Calcicrop es un calcio 100% complejoado con compuestos lignosulfónicos. Mejora la disponibilidad del calcio en la solución del suelo, facilitando su absorción por las raíces en los estados fenológicos más críticos. Con Calcicrop se consigue un mejor desarrollo de todas los órganos y estructuras de la planta, gracias a las funciones estructurales y de mensajería en los procesos de división celular que posee el calcio dentro de las plantas. Gracias a su formulación (LS) se puede inyectar en cualquier sistema de riego presurizado.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivos	Dosis General	Observaciones
Pomáceas (manzano, peral)	20-40 L/ha	Inicio de aplicaciones desde caída de pétalos.
Berries (arándano, frutilla)		
Cerezos		
Vid de mesa	20-30 L/ha	Inicio de aplicaciones desde 50% flor.
Vid vinífera		
Carozos (Ciruelo, nectarino, duraznero)		
Hortalizas	10-20 L/ha	Inicio de aplicaciones desde trasplante.

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
FT CACROP	01/2021	16.09.21

PERIODO DE CARENIA (días)

No se considera por no dejar residuos químicos sobre los vegetales tratados.

TIEMPO DE REINGRESO

Una vez seco el follaje o drenado el suelo después de realizada la aplicación para personas y animales.

MISCIBILIDAD

CALCICROP no debe mezclarse con otros productos en sistemas de fertirrigación. Una vez aplicado el producto deben lavarse bien con agua los sistemas de goteo y/o inyección con el fin de evitar posibles obstrucciones de los sistemas de riego.

FITOCOMPATIBILIDAD

No existen antecedentes de fitotoxicidad ni en especies ni en variedades si se aplica CALCICROP de acuerdo con las recomendaciones vertidas en su etiqueta.

OBSERVACIONES**a) De las condiciones de tiempo.**

No hay restricciones especiales.

b) De la preparación de la mezcla.

Para su preparación y posterior aplicación se debe revolver el contenido del balde antes de vaciar al tanque de fertirrigación. En algunos casos, puede realizarse una premezcla con igual volumen de agua y posteriormente vaciar la solución en el estanque de fertilización, siempre manteniendo el agitador en funcionamiento.

c) De la aplicación de la mezcla.

Injectar la mezcla durante el último tercio del tiempo de riego (ej. Tiempo de riego 6 horas, injectar durante la hora 4 a 5,5). Considerar siempre un tiempo de lavado suficiente para asegurar que salga todo el producto del sistema.

CALCICROP debe aplicarse con suelo húmedo para lograr la mejor conducción de la mezcla en el suelo.

d) Número de aplicaciones por temporada.

De acuerdo con tabla de recomendaciones de uso.

e) Parámetros de calidad de CALCICROP.

Contenido de metales pesados: Cd <5 ppm; Pb <5 ppm; Hg <5 ppm; As <5 ppm.

pH: 1,5-3,5

Densidad: 1,3-1,34 g/cc

Solubilidad: 1000 g/L

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.

En caso de intoxicación o de ingesta accidental, llame al CITUC, Centro de Información Toxicológica de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica.

Teléfono 2 2635 3800.