

# CENTEON MAX®

## BIO-FERTILIZANTE (WP)

**CENTEON MAX® WP** es un bio fertilizante, estimulante biológico en base a dos cepas de *Trichoderma* spp. y una cepa de *Bacillus* spp., formulado en polvo mojable, con amplia aplicabilidad sobre semillas y plantas. Presenta acción como estimulante de crecimiento, mejorando el desarrollo vegetativo.

### COMPOSICIÓN:

*Trichoderma* spp\* 2,4 % p/p (24 g/kg)  
*Bacillus* spp\*\* 1,2 % p/p (12 g/kg)  
Cofomulantes c.s.p 100% p/p (1 kg)

\* Contiene una concentración de cepa  $1 \times 10^8$  ufc/g

\*\* Contiene una concentración de cepa  $1 \times 10^8$  ufc/g

Componentes				Metales Pesados	
SiO <sub>2</sub>	64,19	MgO	0,66	Arsénico	3,178 (mg/kg As)
TiO <sub>2</sub>	0,51	CaO	3,42	Cadmio	<0.010 (mg/kg Cd)
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11,65	Na <sub>2</sub> O	0,75	Mercurio	0.106 (mg/kg Hg)
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2,53	K <sub>2</sub> O	1,6	Plomo	6,320 (mg/kg Pb)
MnO	0,03	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,03		

N.D = NO Detectado  
\*Limite de detección Cadmio 0.001 mg/kg  
\*\*Limite de detección Mercurio 0.001 mg/kg



**CANTIDAD:      LOTE:      VENCIMIENTO:**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**Fabricado por Bio Insumos Nativa SpA**

Parcela Antihue Lote 4 B2, Maule, Chile Fono: +56-71-2970696 Casilla 6 Maule/  
ventas@bionativa.cl | www.bionativa.cl

® Marca registrada de Bio Insumos Nativa SpA

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Para su seguridad en la preparación y durante la aplicación:** evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Utilizar ropa protectora adecuada para la labor.

**Para su seguridad después de la aplicación:** lávese después del trabajo y antes de comer. Cámbiese y lave la ropa de trabajo antes de volver a utilizarla.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**

**EN CASO DE INGESTIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**

**LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**

**NO ES TÓXICO A ORGANISMOS ACUÁTICOS, PECES, AVES, ANIMALES NI ABEJAS.**

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

**CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**

**FONO: +56-2-26353800**

**CITUC EMERGENCIAS QUÍMICAS**

**FONO: +56-2-22473600 - ATENCIÓN LAS 24 HORAS**

**BIO INSUMOS NATIVA SPA.:**

**(+56-71) 2970696/2970698**

**NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO • NO EXPLOSIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO

Promueve la estimulación natural del crecimiento de las plantas, activando el desarrollo de raíces. Su aplicación preventiva ayuda a superar deficiencias en el crecimiento de las plantas bajo condiciones de estrés tanto de origen biótico y abiótico.

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Hortalizas	2 a 5 g/l de agua o	Aplicación desde siembra o trasplante, hasta cosecha.
	1 a 2 kg/ha	Aplicación al sustrato o mediante inmersión de plántulas o con el riego.
Berries	1 a 2 kg/ha	Aplicar en plantaciones, al suelo o mediante inmersión de plantas o con el riego. En plantas establecidas, permite aplicaciones en brotación, desarrollo y postcosecha a través de riego o aspersión al suelo. Considerar por hoyo de plantación 3- 5 g/planta como espolvoreo.
	(dosis mínima 200 g/100 l de agua)	Aplicación foliar desde floración a precosecha, mojamiento mínimo de 400 a 800 l/ha.
Frutales y vides	1 a 2 kg/ha	Aplicación foliar desde floración a precosecha, mojamiento mínimo de 400 a 800 l/ha.
	(dosis mínima 200 g/100 l de agua)	Aplicar en plantaciones, al suelo o mediante inmersión de plantas o con el riego. En plantas establecidas, permite aplicaciones en brotación, desarrollo y postcosecha a través de riego o aspersión al suelo. Considerar por hoyo de plantación 3- 5 g/planta como espolvoreo.
Frutales y vides	1,5 a 2 kg/ha	Aplicar en plantaciones, al suelo o mediante inmersión de plantas o con el riego. En plantas establecidas, permite aplicaciones en brotación, desarrollo y postcosecha a través de riego o aspersión al suelo. Considerar por hoyo de plantación 3- 5 g/planta como espolvoreo.
	(500 g/100 l de agua)	Aplicación foliar desde floración a precosecha, mojamiento de 500 a 2000 l/ha.
Frutales y vides	1 a 2 kg/ha	Aplicación foliar desde floración a precosecha, mojamiento de 500 a 2000 l/ha.
	(dosis mínima 100 g/100 l de agua)	

**Preparación de la mezcla:** Agitar fuertemente el envase antes de usar. La preparación debe aplicarse máximo 4 horas después de preparada y mantenida en agitación.

**Compatibilidad:** Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos, fungicidas y antibióticos. No mezclar **CENTEON MAX® WP** con plaguicidas y agroquímicos sin realizar antes una prueba de compatibilidad o por instrucción del fabricante. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante.

**Almacenaje:** Debe ser almacenado en ambiente fresco y seco por un máximo 12 meses. Mantener en su envase original, con su respectiva etiqueta.

**Fitotoxicidad:** No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

**Período de Carencia:** No tiene días de carencia, ni restricciones de reingreso.